

<<儿科护理>>

图书基本信息

书名：<<儿科护理>>

13位ISBN编号：9787030367488

10位ISBN编号：7030367480

出版时间：贺鸿远、田芸芳 科学出版社 (2013-02出版)

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<儿科护理>>

书籍目录

第1章总论 第1节儿科护理的任务、范围与特点 第2节儿科护士的角色与素质要求 第3节小儿年龄分期及各期特点 第4节生长发育 第5节小儿营养与喂养 第6节计划免疫 第7节儿科医疗机构的设施及护理管理 第8节小儿用药的特点及护理 第9节儿科常用护理技术操作 第2章新生儿与新生儿疾病患儿的护理 第1节正常足月新生儿及早产儿的特点及护理 第2节新生儿缺氧缺血性脑病患儿的护理 第3节新生儿颅内出血患儿的护理 第4节新生儿脐炎患儿的护理 第5节新生儿败血症患儿的护理 第6节新生儿寒冷损伤综合征患儿的护理 第7节新生儿黄疸患儿的护理 第8节新生儿低血糖患儿的护理 第9节新生儿低钙血症患儿的护理 第3章营养性疾病患儿的护理 第1节蛋白质—能量营养不良患儿的护理 第2节维生素D缺乏性佝偻病患儿的护理 第3节维生素D缺乏性手足搐搦病患儿的护理 第4章消化系统疾病患儿的护理 第1节消化系统解剖、生理特点 第2节口炎患儿的护理 第3节腹泻患儿的护理 第4节小儿液体疗法及护理 第5章呼吸系统疾病患儿的护理 第1节小儿呼吸系统解剖、生理特点 第2节急性上呼吸道感染患儿的护理 第3节急性支气管炎患儿的护理 第4节肺炎患儿的护理 第6章循环系统疾病患儿的护理 第1节小儿循环系统解剖、生理特点 第2节先天性心脏病患儿的护理 第3节病毒性心肌炎患儿的护理 第7章泌尿系统疾病患儿的护理 第1节小儿泌尿系统解剖、生理特点 第2节急性肾小球肾炎患儿的护理 第3节肾病综合征患儿的护理 第4节泌尿道感染患儿的护理 第8章造血系统疾病患儿的护理 第1节小儿造血及血液的特点 第2节小儿贫血的概述 第3节营养性缺铁性贫血患儿的护理 第4节营养性巨幼红细胞性贫血患儿的护理 第5节血友病患儿的护理 第9章神经系统疾病患儿的护理 第1节小儿神经系统解剖、生理特点 第2节化脓性脑膜炎患儿的护理 第3节病毒性脑炎患儿的护理 第10章小儿免疫性疾病患儿的护理 第1节风湿热患儿的护理 第2节过敏性紫癜患儿的护理 第11章传染性疾病患儿的护理 第1节麻疹患儿的护理 第2节水痘患儿的护理 第3节流行性腮腺炎患儿的护理 第4节猩红热患儿的护理 第5节小儿结核病患儿的护理 第12章常见小儿急症患儿的护理 第1节惊厥患儿的护理 第2节急性充血性心力衰竭患儿的护理 第3节急性呼吸衰竭患儿的护理 实习指导 实习一小儿体格发育的测量及评价 实习二婴儿喂养 实习三儿科常用护理操作 实习四正常足月新生儿、早产儿的特点及护理 实习五维生素D缺乏性佝偻病患儿的护理 实习六腹泻患儿的护理 实习七肺炎患儿的护理 实习八急性肾炎患儿的护理 实习九营养性缺铁性贫血患儿的护理 实习十结核性脑膜炎患儿的护理 实习十一惊厥患儿的护理 附录 附录1脑脊液、血液检查正常参考值 附录2小儿常用食品及水果营养成分表（每100g含量） 附录3常见静脉输液配伍禁忌 儿科护理教学大纲 选择题参考答案

<<儿科护理>>

章节摘录

版权页：插图：（3）哺乳方法 1）开奶时间：产后应尽早开始哺喂母乳，如母子情况良好，可在产后15分钟～2小时开始吸吮母亲乳头，以促进乳汁的分泌和排出。

开始如乳汁分泌少，可适当加喂糖水。

2）喂乳次数：可根据婴儿饥饱和吸吮情况掌握，不宜严格规定间隔时间及次数，可按需哺乳。

有利于通过吸吮刺激催乳素及缩宫素的分泌，以促进泌乳及产乳反射的建立。

3）喂乳方法：喂哺时，应抱起婴儿呈半坐姿势躺在母亲怀里哺喂，保持呼吸道通畅。

哺乳后应将婴儿抱起，头放在母亲肩上，轻轻拍背，促使胃内空气排出，以防止吐奶。

食后应右侧卧位，床头略高，避免溢乳引起窒息。

4）断奶：应逐渐进行，在正常添加辅助食品的条件下，10～12个月为断奶最适当的时期。

一般先从6～8个月起每日先减少一次哺乳，用辅助食品代替，以后逐渐减少哺乳次数直至断奶。

如遇炎热夏季或婴儿疾病时宜延迟断乳，但一般不超过1岁半。

使用的一种喂养方法。

当母乳量确实不足时，一般先喂母乳，将乳房吸空，再补充代乳品，称补授法。

若乳汁足够，但因特殊原因不能完全母乳哺喂，可用代乳品一次或数次代替母乳，称代乳法。

3.人工喂养母亲由于各种原因不能亲自哺乳时，可采用其他动物乳（如牛奶、羊奶等）或其他代乳品哺喂婴儿，称人工喂养。

（1）人工喂养的食品 1）鲜牛奶：为常用人工喂养的代乳品，其与人乳的区别为：牛乳中含蛋白质为3.3%，较人乳高，但以酪蛋白为主，酪蛋白遇胃酸后形成凝块大，缺少脂肪酶，不易消化；牛乳中不饱和脂肪酸较人乳少，脂肪球大，缺少脂肪酶不易消化；牛乳中含糖量少，供能较少，故哺乳时需要另外加糖，且糖以甲型乳糖为主，可促进大肠埃希菌的生长；牛乳中钙、磷比例为2：1，不利于钙的吸收；人乳中所含的免疫成分及酶等成分在牛乳中含量极少，且加热后易破坏。

此外，牛奶还存在着温度不易掌握，不经济、不方便、易污染等缺点。

2）配方奶粉：配方奶粉又称母乳化奶粉，它是为了满足婴儿的营养需要，运用现代工艺在普通奶粉的基础上加以调配的奶制品。

其营养成分尽可能接近母乳，与普通奶粉相比，配方奶粉去除了部分酪蛋白，增加了乳清蛋白；去除了大部分饱和脂肪酸，加入了植物油、DHA（二十二碳六烯酸，俗称“脑黄金”）、AA（花生四烯酸）等不饱和脂肪酸；配方奶粉中加入了乳糖，含糖量接近人乳；降低了矿物质含量，以减轻婴幼儿肾脏负担；另外还添加了微量元素、维生素和其他成分，使之更接近人乳营养成分。

目前，母乳喂养是首选，假如客观条件不能母乳喂养的，应首选配方奶粉。

目前，已有多种配方奶粉分别适用于不同月龄婴儿营养需要。

<<儿科护理>>

编辑推荐

《全国中等卫生职业教育规划教材:儿科护理(第2版)(案例版)(供护理、助产等相关专业使用)》内容条理清晰，构思新颖，繁简得当，重点突出，图文并茂，版式新颖、活泼，是一本实用性较强的新型教材。

<<儿科护理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>