

<<疼痛诊疗学>>

图书基本信息

书名：<<疼痛诊疗学>>

13位ISBN编号：9787117147125

10位ISBN编号：7117147121

出版时间：2011-8

出版单位：人民卫生

作者：谭冠先 编

页数：220

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<疼痛诊疗学>>

内容概要

谭冠先主编的《疼痛诊疗学》（第3版）是以第2版为基础进行修订补充。

把一些新的概念、新的技术和新的知识充实到教材中，同时根据教学大纲要求对第2版部分内容进行适当删节。

本教材共16章，除包括疼痛学的基础理论、基本知识、基本诊疗技术和急慢性疼痛的处理外，补充了疼痛原理研究的新成果，对疼痛的微创介入治疗技术进行了更详细的阐述，增加了临床常见的风湿性痛与软组织疼痛内容。

<<疼痛诊疗学>>

书籍目录

- 第一章 绪论
- 第二章 疼痛的基础理论与知识
- 第三章 疼痛的诊断学基础
- 第四章 疼痛的药物治疗
- 第五章 疼痛的神经阻滞与局部注射治疗
- 第六章 微创介入手术治疗
- 第七章 疼痛的其他治疗方法
- 第八章 头面部痛
- 第九章 颈、肩、上肢疼痛的治疗
- 第十章 胸腹部疼痛
- 第十一章 腰部痛及下肢痛
- 第十二章 风湿痛与软组织疼痛
- 第十三章 神经病理性疼痛
- 第十四章 癌性疼痛
- 第十五章 手术后疼痛
- 第十六章 分娩镇痛

<<疼痛诊疗学>>

章节摘录

版权页：插图：镇痛药物与分娩镇痛对母体的影响如下：1.治疗剂量的局部麻醉药并不影响宫缩。剂量过大或将局部麻醉药误注入血管时则子宫收缩加强。

2.镇痛剂量的哌替啶不抑制宫缩，有时因用药后产痛减轻反而使宫缩有所增强。但过早使用大剂量镇痛药可使宫缩潜伏期延长，在宫缩活跃期给予过多的镇痛药如静脉注射哌替啶100mg，也可使宫缩减弱或延缓宫颈扩张，从而延长第一产程。

吗啡的镇痛作用是哌替啶的10倍，母体用药后，产妇会出现头晕、恶心、呕吐等副作用。目前主要用于椎管内给药分娩镇痛而不用于产科分娩。

3.椎管内麻醉的平面如不超过T10皮节节段，对宫缩可无影响；如平面超过T5，则宫缩减弱，频率减慢；在进入宫缩活跃期前使用椎管内麻醉可使潜伏期延长；过早使用麻醉使盆腔肌肉松弛，可能影响胎头的俯仰和旋转而延缓胎头下降。

用硬膜外间隙阻滞镇痛，第二产程往往延长，此与宫缩无关，主要是麻醉后产妇失去下屏感，更因腹肌和肛提肌松弛，使产妇的下屏力明显减弱所致。

<<疼痛诊疗学>>

编辑推荐

《疼痛诊疗学(第3版)》供麻醉学专业用。

<<疼痛诊疗学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>