

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

图书基本信息

书名：<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

13位ISBN编号：9787117151528

10位ISBN编号：7117151528

出版时间：2011-12

出版单位：人民卫生

作者：汤海峰//何菊英//班立丽//赵培西|主编:王育琴

页数：130

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

内容概要

本书分为六章，从糖尿病概述、糖尿病的预防与治疗、糖尿病药物治疗学概述、国家基本药物的合理使用、胰岛素笔及其合理使用，以及常见问题及解答等方面，全面系统地介绍了国内外有关糖尿病及其并发症的理论和预防、治疗方法，特别是常见糖尿病治疗药物的合理使用，同时也反映了该领域的最新进展，具有科学性和实用性。

《糖尿病治疗药物的合理使用》主要为基层医疗机构的医生、药师和护士编写，兼有工具书和教材的双重特色，以便于基层医务人员在实际工作中学习查阅，提高基本药物的合理使用。

此外，本册亦可供医学生在学习糖尿病课程时课外自学之用，或作为教师教学补充用书；对于广大糖尿病患者，也将是他们有益的自助阅读材料。

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

书籍目录

第一章 疾病概述

第一节 相关概念

- 一、1型糖尿病
- 二、2型糖尿病
- 三、妊娠期糖尿病

第二节 诊断标准

- 一、1型糖尿病的诊断依据
- 二、2型糖尿病的诊断依据
- 三、糖尿病的鉴别诊断

第三节 糖尿病的临床表现与并发症

- 一、临床表现
- 二、并发症

第四节 糖尿病的流行病学

- 一、全球糖尿病的现状与流行趋势
- 二、我国糖尿病的现状与流行趋势
- 三、糖尿病经济学
- 四、其他

第二章 糖尿病的预防与治疗

第一节 糖尿病的危险因素

第二节 糖尿病的预防

- 一、糖尿病的一级预防
- 二、糖尿病的二级预防
- 三、糖尿病的三级预防

第三节 糖尿病的治疗

- 一、糖尿病治疗的原则和代谢控制的目标
- 二、生活方式的干预
- 三、高血糖的控制

第三章 糖尿病药物治疗学概述

第一节 概述

第二节 药物治疗原则

第三节 糖尿病治疗药物的选择

- 一、糖尿病治疗药物
- 二、药品说明

第四节 糖尿病并发症与并发症的预防与治疗

- 一、代谢控制和治疗的目标
- 二、糖尿病并发症筛查
- 三、具体并发症及其治疗与预防

第五节 糖尿病及其并发症治疗处方举例

- 一、1型糖尿病及其并发症治疗处方举例
- 二、2型糖尿病及其并发症治疗处方举例

第六节 国家基本药物品种——西药

第四章 国家基本药物的合理使用

第一节 胰岛素

- 一、概述
- 二、各论

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

第二节 口服降糖药

一、概述

二、各论

第五章 胰岛素笔及其合理使用

第一节 胰岛素注射装置概述

一、概述

二、胰岛素注射装置简介

第二节 胰岛素笔的类型及其使用

一、耐用型胰岛素笔

二、特充型胰岛素笔

第三节 临床常用胰岛素笔的合理使用

一、诺和笔系列

二、优伴笔系列

三、得时系列

第六章 常见问题及解答

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

章节摘录

版权页：插图：而且，糖尿病患者各年龄段缺血性脑卒中的发生率均高于非糖尿病者。糖尿病脑血管病的危险因素包括高血糖、高血压、血脂异常、血液流变学异常、吸烟以及慢性炎症状态等。

其中高血压尤为重要，为糖尿病缺血性脑病的独立危险因素。

在缺血性脑卒中患者中，77%的血压未控制，因此降压治疗对降低脑卒中的发病率十分重要。

这也为UKPDS及其他降压治疗的临床试验，如HOPE、HOT、LIFE等所证实。

老年人心肌梗死亦为脑卒中的危险因素。

国外研究121432例65岁以上的急性心肌梗死住院患者，出院后发生脑卒中的危险性较无心肌梗死者高2.5倍。

(3) 糖尿病眼病：糖尿病患者眼的各部位均可出现病变，如角膜异常、虹膜新生血管、视神经病变等，糖尿病患者青光眼和白内障的患病率高于相同年龄非糖尿病者。

糖尿病视网膜病变是糖尿病患者失明的主要原因，各型糖尿病的视网膜病变患病率随患病时间和年龄的增长而上升。

99%的1型糖尿病和60%的2型糖尿病，病程在20年以上者，几乎都有不同程度的视网膜病变。

10岁以下患糖尿病的儿童则很少发生视网膜病变，青春期后糖尿病视网膜病变的危险性上升。

(4) 糖尿病肾病：20%~30%的1型或2型糖尿病患者发生糖尿病肾病，其中一部分进展为终末期肾病。

如未进行特别干预，在有持续性微量白蛋白尿的1型糖尿病患者中约80%的人于10~15年内发展为临床肾病，此时可出现高血压。

一旦临床肾病发生，如不进行有效干预，几年之内肾小球滤过率逐渐下降，10年后50%、20年后75%以上的患者将发展为终末期肾病。

2型糖尿病患者糖尿病确诊后，不少人旋即出现微量清蛋白尿，甚至显性肾病，如无特殊干预，其中20%~40%的患者进展为临床肾病，20年后约20%进展为终末期肾病。

由于2型糖尿病患者的数量大，因此目前在西方国家进行透析的肾病患者中一半以上为糖尿病患者。

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

编辑推荐

《糖尿病治疗药物的合理使用》编辑推荐：基本药物制度是政府为满足人民群众的重点卫生保健需要，合理利用有限的医药卫生资源，保障人民群众用药安全、有效、合理而推行的国家药物政策。

2010年国家基本药物政策将全面覆盖基层医疗卫生机构。

为了配合国家基本药物目录的颁布，保障目录内药品的合理使用，特编写《基层医务人员基本药物合理使用培训手册丛书》。

本套丛书针对基层医疗机构的医生、药师和护士编写，旨在提高基本药物的合理使用。

汤海峰、何菊英、班立丽、赵培西主编的《糖尿病治疗药物的合理使用》全面系统地介绍了国内外有关糖尿病及其并发症的理论和预防、治疗方法，特别是常见糖尿病治疗药物的合理使用。

《糖尿病治疗药物的合理使用》内容简洁实用，兼有工具书和教材的双重特色，以便于基层医务人员在实际工作中学习查阅。

“十一五”国家科技支撑计划重点课题，“基层医疗机构主要基本药物合理使用评价和研究”！

<<糖尿病治疗药物的合理使用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>