

<<自我药疗·过敏专刊>>

图书基本信息

书名：<<自我药疗·过敏专刊>>

13位ISBN编号：9787122001818

10位ISBN编号：7122001814

出版时间：1970-1

出版时间：化学工业出版社

作者：《自我药疗》编辑部 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<自我药疗·过敏专刊>>

内容概要

《自我药疗：过敏专刊》主要内容为过敏 Hypersensitivity、赏花须防花粉过敏、过敏性疾病、湿疹、神经性皮炎、荨麻疹、过敏急症的紧急救治、漫话三大过敏原--真菌，花粉，尘螨、过敏性鼻炎、哮喘的药物治疗、常见出疹性疾病的区分与防治、过敏性紫癜、化妆品过敏防治小常识、生活·健康 Life & Health、春季多发病治疗及其防护、食疗粥谱、素食未必助长寿等。

<<自我药疗·过敏专刊>>

书籍目录

章节摘录

版权页：插图：三、强酸强碱烧伤 化学物品强酸强碱对组织的损害和酸、碱类的浓度、接触时间长短，接触量多少有关。

强酸对组织的局部损害为强烈的刺激性腐蚀，不仅伤面被烧，并能向深层侵蚀。

但由于局部组织细胞蛋白被凝结，从而能够阻止烧伤的继续发展。

碱性物质更能渗透到组织深层，日后形成的疤痕较深。

常见强酸有硫酸、硝酸、盐酸，强碱有氢氧化钠、氢氧化钾等。

硫酸烧伤的伤口呈棕褐色盐酸、石炭酸烧伤的伤口呈白色或灰黄色：硝酸烧伤的伤口呈黄色。

救治方法：脱离现场，被少量强酸、碱烧伤，立即用纸巾、毛巾等蘸吸，并用大量的流动清水冲洗烧伤局部，冲洗时间应在15分钟以上；被大量强酸、强碱烧伤，应用大量清水冲洗烧伤局部，冲洗时间应在20分钟以上，冲洗时将病人被污染的衣物脱去；如口服强酸、碱的病人，则可服用蛋清、牛奶、面糊、稠米汤或氢氧化铝凝胶保护口腔、食道及胃黏膜；现场紧急处理后要送往烧伤专科医院接受治疗。

四、毒蛇咬伤 毒蛇咬伤一般于伤口处可见两个较大和较深的牙痕，并在20分钟内会局部疼痛、肿胀、麻木和无力的症状。

蛇毒主要分神经毒、血循毒、混合毒三种，神经毒以神经麻痹功能丧失为主，血循毒以凝血功能障碍致出血症状为主。

剧毒蛇毒能引起呼吸困难，甚至呼吸衰竭在8~72小时内死亡。

救治方法：尽快送往医院的同时进行紧急现场急救。

伤者要保持镇静、避免行动，最好担架救送，以减少有毒血液的蔓延。

在伤口靠近心脏的一侧用止血带或布条等扎紧。

结扎要适度，太松达不到效果，太紧容易造成肢体缺血坏死。

为避免远端肢体坏死，结扎后要每20分钟松开1~2分钟，再扎上。

用清洁的冷水反复冲洗伤口表面的蛇毒。

采用下列方法促使毒液排出：一是用身边刀具将咬伤处划开，用力将毒液挤出，挤至血液恢复正常色二是用嘴吸毒，吸出后立即吐出并用清水漱口，口腔有破溃者禁用此法，以免间接中毒。

五、刺胞皮炎 刺胞皮炎常发生在夏季游海澡者及渔民身上，主要是接触水母、海胆及其他腔肠动物所致，主要表现为接触部位会产生疼痛、剧痒，局部有线状丘疹样的皮疹，伴随潮红与水肿，严重时也可能有水泡、出血、坏死与溃疡性变化，重者可引起恶心呕吐，甚至引发过敏性休克。

救治方法：在进入刺胞皮炎流行的海区操作时，要穿戴防护衣物、手套和靴鞋。

应尽量不要移动伤肢，不要使用清水冲洗，因为用水冲洗可能导致刺细胞的进一步活化，应用海水小心地清洗伤口。

然后使用含乙醇的液体中和毒液，如果没有含乙醇液体可供使用，可以用热盐水中中和替代，中和毒液后，可用干沙等贴在皮肤上五分钟。

再用尖锐的器具（如刀子）来移除触手，但绝不要使用没带手套的手来清除触手，最后再用盐水清洗一次，严重时，特别是小孩子，可使用止血带来减低静脉回流。

<<自我药疗·过敏专刊>>

编辑推荐

《自我药疗(过敏专刊)》由北京化学工业出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>