

<<治疗指南>>

图书基本信息

书名：<<治疗指南>>

13位ISBN编号：9787502576363

10位ISBN编号：7502576363

出版时间：2006-1

出版时间：化学工业出版社

作者：李大魁

页数：325

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<治疗指南>>

内容概要

《治疗指南》丛书由澳大利亚治疗指南有限公司组织编写，国内相关领域的学者、专家翻译。本丛书在国际治疗指南领域中影响较大、主要提供了相关疾病诊断的定位指导、并阐述了简洁、切实可行的治疗方案，是一套简明实用的临床治疗指南。

《治疗指南》丛书共10个分册，相关的分册内容在诊断、治疗方面各有呼应，可作为临床在住院医工作中的必备参考读物。

《抗生素分册》第12版积淀了前11版的精华，介绍了人体诸多组织感染的抗菌诊疗方案，涉及心血管系统、消化系统、神经系统、生殖系统等，涵盖由细菌、病毒、寄生虫、真菌引起的多种常用疾病，并说明了内外科抗生素的用药原则。

本版将抗生素使用原则及临床治疗选用方法介绍得更加全面、深入、细致、诊疗方法精要、指导性强，适合执行药师监督抗生素药合理应用，并适合临床医师诊断后合理选用抗生素。

<<治疗指南>>

书籍目录

1 抗生素使用原则2 抗生素相关知识介绍3 骨和关节感染4 心血管系统感染5 中枢神经系统感染6 眼部感染7 胃肠道感染8 生殖道感染9 HIV感染10 腹腔感染11 疟疾12 分枝杆菌感染13 口腔和牙齿感染14 内科预防用药15 外科预防再药16 下呼吸道感染17 上呼吸道感染18 败血症19 皮肤和软组织感染20 全身感染21 泌尿道感染22 附录索引

<<治疗指南>>

章节摘录

2.2.15 大观霉素 大观霉素 (spectinomycin) 抗菌谱较广, 但临床上只限于用于软下疳和淋病的治疗。

2.2.16 磺胺类和甲氧苄啶 磺胺类药物目前在一般治疗中很少使用。磺胺甲噁唑 (sulfame-thoxazole) 同二氢叶酸还原酶抑制剂甲氧苄啶 (trimethoprim) 组成复方制剂复方磺胺甲噁唑, 在过去曾广泛用作广谱抗菌药物, 尤其是治疗呼吸道和泌尿道感染。然而, 此复方制剂因含磺胺类药物可发生严重的不良反应, 尤其是老年患者。单独使用甲氧苄啶可有效治疗泌尿道感染; 复方制剂仅限于几种需要联合用药的临床情况, 包括治疗和预防卡氏肺孢子菌 (Pneumocystis carinii) 感染, 以及治疗单核细胞增多性李斯特菌和诺卡菌 (Nocardia) 感染。甲氧苄啶糖浆适用于儿童, 这种制剂并不是全球都有供应, 必要时可能需要用糖浆剂型的复合制剂 (详见澳大利亚制剂处方手册)。

对复方磺胺甲噁唑的组分发生过敏反应的现象常见。若临床需要使用此制剂, 应根据附录3提供的方案进行脱敏治疗。

2.2.17 四环素类 四环素类药物具有广谱抗菌作用, 抗菌谱包括革兰阳性菌和革兰阴性菌、衣原体、立克次体、支原体、螺旋体及某些非结核分枝杆菌和原虫等。

它们通常为抑菌剂。耐药菌的出现及其他抗生素的出现, 减少了此类药物的使用。四环素类药物主要用于盆腔炎、痤疮、牙周病、社区获得性肺炎、布鲁杆菌病、鼠疫、霍乱和莱姆病的治疗。四环素类药物禁用于8岁以下儿童; 妊娠的前18周 (受孕后的16周) 使用四环素类药物是安全的, 但妊娠18周后使用该类药物会使婴儿牙齿变黄。哺乳期妇女可短期使用。所有四环素类药物均可能发生光敏反应及念珠菌过度生长。

四环素 (tetracycline) 和地美环素 (demeclocycline) 需空腹服药。米诺环素 (minocycline) 和多西环素 (doxycycline) 两者的半衰期较长, 食物对二者的吸收影响不大。米诺环素对某些耐四环素细菌 (包括某些葡萄球菌) 有效, 但由于可引起良性颅内高压、前庭不良反应和皮肤色素沉着 (罕见), 因而限制了此药的使用。

大多数情况下优先选择使用多西环素, 多西环素每天给药一次, 可增加患者依从性。此药可引起食管炎, 服药时要大量饮水冲服 (至少一大杯水), 并在服药后保持直立位至少30分钟。多西环素是杀裂殖体剂, 也可用于预防疟疾。

2.2.18 抗分枝杆菌药物 2.2.18.1 氯法齐明 氯法齐明 (clofazime) 是一种独特的药物, 除引起可逆的皮肤变色外, 很少引起严重不良反应, 用于治疗麻风。

2.2.18.2 氨苯砒 氨苯砒 (dapsone) 为砒类化合物, 不良反应与磺胺类药物相似。

2.2.18.3 乙胺丁醇 乙胺丁醇 (ethambutol) 是抑菌剂, 抑制分枝杆菌细胞壁的合成。主要不良反应包括视神经炎和外周神经病变, 但如果患者肾功能正常, 常规剂量下, 这些不良反应少见。

治疗前, 应检查患者的视力和色觉, 只有在患者视力和色觉正常的情况下, 方可使用该药物。若出现视觉症状, 应立即停药。6岁以下儿童不建议使用。

.....

<<治疗指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>