

<<妇产科合理用药>>

图书基本信息

书名：<<妇产科合理用药>>

13位ISBN编号：9787506739832

10位ISBN编号：7506739836

出版时间：2009-1

出版时间：中国医药科技出版社

作者：张靖霄，刘冬梅 主编

页数：304

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<妇产科合理用药>>

### 前言

1985年，在内罗毕国际合理用药专家研讨会上，提出了“对症开药、供药适时”等六项合理用药（rational drug use）内容。

1987年，世界卫生组织（WHO）又提出了“处方用药应为适宜的药物”等五项关于合理用药的具体要求。

当前，就全球范围来看，一般所指的合理用药包括安全、有效、经济、适当四个基本要素。

随着改革开放的不断深入，中国医药产业也在30年间得到。

了巨大的发展，药物品种随着医药科技的发展在，而迅速增加，现在国内常用的处方药物已达7000种之多，然而在当前的临床药物治疗过程中，药物治疗水平并未伴随着药品种类的增加而提高，药品浪费、药疗事故、药源性疾病等不合理用药现象时有发生，这些药品的不合理使用，在危及人类健康与生命安全的同时，也增加了社会的负担和资源的消耗。

2008年8月，卫生部副部长、国家食品药品监督管理局局长邵明立撰写署名文章《建立国家基本药物制度满足群众基本用药需求》，指出：“健全和落实医疗卫生机构合理用药的制度与责任”是建立国家基本药物制度的重要举措之一。

中国是一个人口大国，近年来，随着社会经济的不断发展和人口老龄化进程的加快，相对短缺的医疗资源与广大人民群众健康需求之间的矛盾日益突出。

为了进一步提高合理用药水平，落实邵明立局长的讲话精神，我们在国家食品药品监督管理局的指导下，组织全国医药卫生各领域的专家教授编写了这套《临床合理用药丛书》。

## <<妇产科合理用药>>

### 内容概要

《妇产科合理用药》分2篇，共12章。

西药篇，对每种药物均介绍了药物概述、药动学、用药指征、用法用量、药物相互作用、禁忌证、不良反应、用药指导、制剂与规格、贮藏；中成药篇，对每种中成药均介绍了药物组成、功能主治、临床应用、用法用量、注意事项、药效研究、不良反应、规格与包装、贮藏。

书中阐述了临床安全、合理使用药物的内容，实用性强。

《妇产科合理用药》适用于妇产科医生参考。

## &lt;&lt;妇产科合理用药&gt;&gt;

## 书籍目录

西药篇 第一章 妇产科用药 第一节 雌激素类药及激素替代药 己烯雌酚 苯甲雌二醇 尼尔雌醇  
 戊酸雌二醇 结合雌激素 结合雌激素/甲羟孕酮 替勃龙 戊酸雌二醇/环丙孕酮 雌二醇  
 雌三醇 炔雌醇 炔雌醚 氯烯雌醚 美雌醇 第二节 促性腺激素释放激素类似药或增强剂 戈舍  
 瑞林 第三节 孕激素类药 黄体酮 炔诺酮 甲地孕酮 甲羟孕酮 孕三烯酮 羟孕酮 氯地孕  
 酮 炔诺孕酮 左炔诺孕酮 去氧孕烯 诺孕酯 奎孕酮 环丙孕酮 第四节 子宫收缩药 缩宫  
 素 麦角新碱 甲麦角新碱 卡前列素 地诺前列酮 垂体后叶素 第五节 子宫松弛药 利托君  
 硫酸镁 沙丁胺醇 间苯三酚 第六节 促性激素类药 氯米芬 绒促性素 尿促性素 第七节 促  
 子宫颈成熟药 普拉睾酮 第八节 阴道炎局部用药 硝呋太尔/制霉菌素 环丙沙星 替硝唑 克  
 霉唑 制霉菌素 重组人干扰素d-2a 结合雌激素 地瑞舒林 益康唑 咪康唑 第九节 其他激  
 素类药 他莫昔芬 达那唑 溴隐亭 氟他胺 第二章 计划生育用药 第一节 口服短效避孕药  
 去氧孕烯 孕二烯酮/炔雌醇 复方醋酸环丙孕酮 第二节 紧急避孕药 左炔诺孕酮 米非司酮  
 第三节 外用避孕药 壬苯醇醚 孟苯醇醚 烷苯醇醚 醋酸苯汞 第四节 终止妊娠药 第三章 妇产  
 科常用影响血液及造血系统药物 中成药篇 第四章 月经失调用药 第五章 更年期综合征用药 第六章 带  
 下病用药 第七章 妇科外用药 第八章 妊娠病用药 第九章 产后病用药 第十章 产后缺乳用药 第十一章  
 乳腺增生病(乳癖)用药 第十二章 不孕症用药 参考文献

## &lt;&lt;妇产科合理用药&gt;&gt;

## 章节摘录

3.本品宜在阵痛诱发剂和阵痛促进剂前列腺素、催产素给药前使用。

4.胎儿发育迟缓及经产道分娩生产有困难的孕妇应慎用。

5.心功能不全,肝肾功能损害者慎用。

【制剂与规格】注射剂:100mg;200mg。

【贮藏】遮光,密闭保存。

(张靖霄王丽娜) 第八节 阴道炎局部用药 阴道炎是阴道黏膜及黏膜下结缔组织的炎症,是妇科门诊常见的疾病。

正常健康妇女,由于解剖学及生物化学特点,阴道对病原体的侵入有自然防御功能,当阴道的自然防御功能遭到破坏,则病原体易于侵入,导致阴道炎症。

幼女及绝经后妇女由于雌激素缺乏,阴道上皮菲薄,细胞内糖原含量减少,阴道pH高达7左右,故阴道抵抗力低下,比青春期及育龄妇女易受感染。

炎症类型有: (1)滴虫性阴道炎:由致病原——阴道毛滴虫所引起的,通过性交传播或间接传播(经浴池、浴盆、游泳池、衣物、敷料及污染的器械等传播),主要表现为外阴瘙痒,白带增多,白带为淡黄色泡沫状,严重时白带可混有血液。

并有灼热感、性交痛,伴有尿道感染时可有尿频、尿痛,甚至血尿。

(2)念珠菌性阴道炎:由致病原——白色念珠菌感染引起,多发生于长期使用激素、抗生素的女性、糖尿病及孕妇身上,传染途径主要是性交、浴池、浴巾等。

主要表现为豆腐渣样白带及外阴瘙痒。

(3)加特纳菌性阴道炎:由致病原——加特纳杆菌引起,可通过性交传染,在性关系混乱的人群中,加特纳菌性阴道炎有高流行率。

加特纳杆菌引起的感染多见于性活跃女性。

急性期白带增多,有鱼腥或氨的臭味,外阴潮湿不适,常伴有阴道灼热感、性交痛及外阴瘙痒。

(4)淋菌性阴道炎:由致病原——淋病双球菌引起,可通过不洁或混乱的性交而传染。

也有少数因借穿感染淋球菌的泳衣,或通过淋球菌污染的浴缸、坐式便器等间接传染。

其症状表现为下腹部疼痛,阴道分泌物增多,显脓性白带,阴道口红肿疼痛等,如不及时治疗,可转为慢性妇科炎症,有10%~20%的妇女可出现不孕或宫外孕。

(5)幼女阴道炎:多见于穿开裆裤的小女孩,发病原因是女孩在玩耍时坐在地上或在地上爬着玩,或手指直接捅进阴道,甚至置放异物,致使外阴、阴道受污染,诱发阴道炎。

主要症状表现为外阴红肿,阴道内流水样分泌物,阴道灼痛或奇痛难忍。

(6)老年性阴道炎:是绝经后妇女常见病,主要是由于雌激素缺乏致局部抵抗力降低,病菌入侵繁殖而引起炎症。

表现为外阴瘙痒或灼热感,严重者尿频、尿痛。

阴道分泌物增多,呈淡黄色,严重者有血性脓样白带,并伴有臭味,此时应进一步检查以排除肿瘤的可能。

(7)孕期阴道炎:女性在怀孕期间,激素水平升高,分泌物增加,阴道酸碱度改变,寄生于阴道区域的细菌也随着环境的改变而发作,其中霉菌性阴道炎在孕妇中最为常见。

孕妇治疗阴道炎用药要特别慎重,可根据阴道炎不同类型选用外用药局部治疗,防止药物导致胎儿畸形。

霉菌会在产道感染胎儿,使新生儿患鹅口疮。

孕妇治疗阴道炎要彻底,以防分娩时产道的真菌侵袭胎儿。

阴道炎应根据症状、体征正确分型,采取相应的药物治疗。

硝咪太尔/制霉菌素(Nifuratel/Nystatin) 【商品名或别名】朗依。

【药物概述】成分:硝咪太尔500mg+制霉菌素20万IU。

硝咪太尔对导致妇女生殖系统感染的细菌、原虫和念珠菌等发挥强烈、有效的杀灭作用,而却很少产生急、慢性副作用。

## <<妇产科合理用药>>

可用于各种单一和混合妇科阴道感染。  
无需病原学诊断即可治疗宫颈炎、阴道炎。  
治疗妇科混合感染，无需联合用药。  
保护乳酸杆菌，促进阴道酸性环境恢复，有效减少复发。  
外用治疗，局部药物浓度高，疗效更好。  
不被人体吸收，无全身副作用，安全性高。  
孕妇可安全使用。

【药动学】尚无人体内药代动力学研究资料。

体外实验表明本品不透过皮肤和黏膜。

【用药指征】治疗由细菌、滴虫、念珠菌引起的外阴、阴道感染和白带增多。

【用法用量】如阴道给药，于晚上临睡前清洗外阴后，将本品1粒放入阴道后穹窿处，每日1次，连用6天，建议使用2个疗程。

【药物相互作用】尚不明确。

【禁忌证】对硝呋太尔或制霉菌素过敏者禁用。

【不良反应】轻度外阴灼热、阴道干涩和恶心。

【用药指导】 1.为获得良好疗效，请尽量将本品置入阴道深部，第二天清晨应进行阴道清洗

2.为防止本品拆碎，请小心拿放，并用剪刀沿线剪开包装材料。

3.治疗期间应避免性生活。

4.使用硝呋太尔治疗期间请勿饮用酒精饮料，酒精会引起不适或恶心，但这种反应会自行消失。

【制剂与规格】胶囊剂：硝呋太尔500mg，制霉菌素20万lu。

【贮藏】避光，密封，阴凉干燥处保存。

## <<妇产科合理用药>>

### 编辑推荐

《妇产科合理用药》由临床医学、药学专家共同打造，破解临床用药难点，着重于药物相互作用、不良反应及用药指导。

<<妇产科合理用药>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>