

<<张仲景方剂学>>

图书基本信息

书名：<<张仲景方剂学>>

13位ISBN编号：9787506751964

10位ISBN编号：7506751968

出版时间：2012-1

出版时间：中国医药科技出版社

作者：吕志杰 主编

页数：367

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<张仲景方剂学>>

内容概要

吕志杰主编的《张仲景方剂学（第2版）》第一章概论从总体上对经方的概念、命名等13个方面进行了系统的讲解；第2-26章把伤寒、金匱的252

首经方统一按功效归类，分为25章，每章之前有概述，之后有“类方串解”

，每首方剂结合古今医家的心得体会和精辟论述，从方剂组成、方药用法、方证释义、主治病证、临床发挥、医案举例等角度进行分析和总结。

《张仲景方剂学（第2版）》博采众长、撷英取华、构思新颖、体例独特、条理清晰，是一部启迪性和实用性很强的学术专著，适合各级中医临床医师阅读。

<<张仲景方剂学>>

书籍目录

- 第一章 概论
- 第二章 解表剂
- 第三章 涌吐剂
- 第四章 泻下逐水剂
- 第五章 活血消癥剂
- 第六章 和解剂
- 第七章 清热剂
- 第八章 回阳温阳剂
- 第九章 温中补虚剂
- 第十章 养阴清热剂
- 第十一章 补肾剂
- 第十二章 消痞剂
- 第十三章 利水剂
- 第十四章 化痰止呕剂
- 第十五章 宽胸通阳剂
- 第十六章 理气剂
- 第十七章 和血剂
- 第十八章 止血剂
- 第十九章 止痛剂
- 第二十章 退黄剂
- 第二十一章 排脓剂
- 第二十二章 固涩剂
- 第二十三章 表里兼治剂
- 第二十四章 寒热补泻并用剂
- 第二十五章 其他内服剂
- 第二十六章 外用剂

<<张仲景方剂学>>

章节摘录

人参汤与理中汤用药、剂量、煎服法等皆相同，惟前方用甘草，后方用炙甘草。

【方证释义】本方功能温中祛寒，健脾益气。

方中干姜温中祛寒；人参补中益气，气充则阳旺；白术健脾燥湿，助运化水湿；炙甘草甘缓补中，调和诸药。

四药合用，共奏温运脾阳之功。

本方有丸、汤二法，一般病缓用丸，病急用汤。

《金匱》称本方为人参汤，其中甘草不炙，四味药用量亦为各三两。

本方证是以中焦虚寒为主要病机的病证。

据《伤寒论》和《金匱》，本方证包括：中寒霍乱，症见吐利，头痛，发热，身疼痛，寒多不用水。

大病瘥后，胸上有寒，喜唾，久不了了。

胸痹属中焦虚寒，寒气上冲者，症见心中痞气，胸满，胁下逆抢心。

太阴病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，不渴。

本证特点是腹痛，喜温喜按，腹虽满而不坚，常兼见倦怠乏力，手足欠温，舌淡、苔白，脉迟弱。

【主治病证】自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈。

（伤寒277）霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不用水者，理中丸主之。

（伤寒386）大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。

（伤寒396）胸痹，心中痞，气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之；人参汤亦主之。

（金匱九.5）【临床发挥】《伤寒集验》：“理中石膏汤，治霍乱烦渴，有热转筋。

即理中汤加石膏。

又曰：理中加茵陈汤，治伤冷中寒，脉弱气虚变为阴黄。

即理中汤加茵陈。

又曰：增损理中汤，治太阴病下之胸满硬，即理中汤加黄芩、枳壳。

右为末，蜜丸如弹大，沸汤融化。

渴者，加天花汤；汗出者加牡蛎。

《医心方》：“小品扶老理中汤，治羸老冷气恶心，食饮不化，腹虚满拘急短气，及霍乱呕逆，四肢冷，心烦满，气闷流汗，理中汤加麦门冬、附子、茯苓。

理中汤加减法与适应症刘渡舟说：理中汤是治疗太阴脾气虚寒证的主方。

脾居中州，依赖脾阳的运化功能而升清降浊，运化水谷精微而为后天之本。

若中阳虚衰，脾阳不运，则寒湿不化，升降不利，即形成了太阴为病。

其症状表现为：腹泻益甚，腹胀不减，时腹自痛，不欲饮食，脉沉迟无力，舌淡苔白。

治用理中汤温中暖寒，健脾运湿，使腹泻止则病愈。

服理中汤后，要经一食顷的时间，须饮热稀粥一升许，避寒保温，勿揭衣被。

理中汤有随证加减之法，录之以供参考：若兼见脐上筑的（即脐上悸动之意），为肾气发动之兆，应去白术而加桂枝降逆平冲；若呕吐频繁的，为胃气上逆之候，则应去白术而加生姜和胃止呕；若腹泻为甚的，虽然有吐，还得用白术补脾以止泻；若心下悸而小便少者，则为挟有蓄饮之征，可加茯苓以利小便；若口渴而欲饮水的，则属脾虚而津液不布，则应增加白术的剂量，补脾以行津液；若中寒甚而腹痛者，则应增加干姜的剂量以暖脾寒；若腹不疼而胀满为甚的，则应去掉白术，而加附子以助阳消阴寒之凝结。

至于理中丸，它的药物同理中汤一样，只是改汤剂为蜜丸如鸡子黄大。

以沸汤和丸，研碎，温服，日3丸，夜2丸为准。

若服药后腹中未热者，亦可增加到三、四丸，量病情轻重而定。

.....

<<张仲景方剂学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>