

<<2010最新版>>

图书基本信息

书名：<<2010最新版>>

13位ISBN编号：9787509136331

10位ISBN编号：7509136334

出版时间：2010-4

出版时间：人民军医出版社

作者：赵春杰 主编

页数：66

字数：103000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

国家执业药师资格考试是我国执业资格考试中最热门考试之一，广大考生都希望能顺利通过考试。为了帮助考生准确全面地理解和掌握应试内容，顺利通过考试，沈阳药科大学从1996年起一直开办执业药师资格考试考前辅导，多年来通过对考试大纲和应试指南的深入准确研究，对考试内容、考试要求、考题特点等具有很好的把握和了解，考生通过辅导会极大提高考试一次通过率。

特别是组织编写的《国家执业药师资格考试指导丛书》(7本，2005年第1版，2006年修订)，是沈阳药科大学多年来从事执业药师考前辅导教师辅导经验的结晶，方便读者准确高效地抓住重点、掌握考点，深受考生们的好评和欢迎。

应广大考生要求，今年，我们特意组织编写出版了各分册的配套全真模拟试卷(含5套试卷，其中许多试题是以往考试的真题)，对试卷、答题卡、试卷袋等全程模拟，让考生有一种身临其境的感觉!特别是首次报名参加执业药师资格考试的考生，可以真实体验执业药师考试题型、考试题量，为日后参加真正的考试做好充分地心理准备。

我们真诚地希望：我们的努力能有助于考生对执业药师资格考试有更好地了解 and 掌握，更有助于考生在执业药师资格考试中获得优异的成绩。

<<2010最新版>>

书籍目录

全真模拟试卷一全真模拟试卷二全真模拟试卷三全真模拟试卷四全真模拟试卷五

章节摘录

1. 关于维生素的合理使用, 下列说法错误的是A. 液体石蜡可减少脂溶性维生素A、维生素D、维生素E、维生素E的吸收2. 可引起尿潴留的是A. 尼卡地平B. 奋乃静C. 糖皮质激素D. 秋水仙碱E. 鱼精蛋白3. 进行药品外观检查最基本的技术依据是A. 比较法B. 抽样法C. 对照法D. 标准法E. 统计法4. 不属于药物信息特点的是A. 紧密结合临床B. 内容广泛多样C. 更新传递快速D. 质量良莠不齐E. 数量急剧膨胀5. 有应用抗菌药物的指征的是A. 细菌性感染B. 非结核分枝杆菌所致的感染C. 病毒性感染D. 结核分枝杆菌所致的感染E. 衣原体所致的感染6. 不宜加在葡萄糖注射液中使用的药物是A. 青霉素类B. 红霉素C. 卡那霉素D. 新生霉素E. 头孢菌素类7. 关于抗菌药物的给药次数与疗程, 下列说法错误的是A. 青霉素类应一日多次给药B. 红霉素应一日多次给药C. 氟喹诺酮类可一日给药1次D. 重症感染者使用氨基糖苷类应一日给药1次E. 抗菌药物一般宜用至体温正常、症状消退后48~72h8. 关于肾功能减退患者抗菌药物的应用, 下列说法错误的是A. 根据感染的严重程度及药敏试验结果选用B. 根据患者肾功能减退程度以及抗菌药物在人体内排出途径调整给药剂量C. 根据患者肾功能减退程度以及抗菌药物在人体内排出途径调整给药方法D. 主要经肾排泄、本身并无肾毒性或仅有轻度肾毒性的抗菌药物可维持原治疗量或剂量略减E. 使用阿米卡星应略减剂量9. 易氧化的药物是A. 酰胺类B. 酯类C. 芳胺类D. 噻嗪类E. 吡唑酮类10. 关于体温计, 下列说法错误的是A. 水银体温计先检查玻璃泡有无裂纹, 以免在应用时水银溢出, 引发水银中毒B. 幼儿、精神失常、高热神昏者应测肛温C. 塑料封装型电子体温计用后消毒时应浸在酒精里D. 新生儿棒式体温计的测量范围在35~40 E. 体温计感温液柱不应中断、自流、难甩11. 可导致驾驶员视近物不清或模糊约持续1周的药物是A. 金刚烷胺B. 吲哚美辛C. 哌替啶D. 阿托品E. 东莨菪碱12. 下面叙述的药物相互作用对药效学的影响不正确的是A. 作用相加或增加疗效B. 拮抗作用C. 敏感化作用D. 影响吸收和分布E. 协同作用和减少药品不良反应13. 眼内污染毒物时, 必须立即用清水冲洗A. 2~5minB. 至少5minC. 5~10minD. 至少~10minE. 10~15min14. 下列用胆碱酯酶复活剂解毒效果最好的是A. 八甲磷B. 特普C. 谷硫磷D. 乐果E. 敌百虫15. 异烟肼中毒解救时可静脉给予摄入量相等的维生素是A. 维生素B6B. 维生素B12C. 维生素B1D. 维生素K1E. 维生素K316. 敌枯双中毒的特效解毒药是A. 氟马西jgB. 乙酰胺C. 毒扁豆碱D. 亚甲蓝E. 烟酰胺17. 关于肝功能受损患者的个体化给药, 下列说法错误的是A. 长期服用对乙酰氨基酚中毒者需口服或静注乙酰半胱氨酸B. 在治疗必需时, 应减小对肝脏有损害的药物剂量, 延长给药间隔C. 应用对肝脏有损害的药物后, 首先注意临床观察, 其次要定期检查肝功能D. 同时患有结核病者使用异烟肼时, 应在用药前、用药中和用药后都进行肝功能化验E. 慢性肝病患者对麻醉药和镇痛药的敏感性减弱。

<<2010最新版>>

编辑推荐

《2010最新版药学综合知识与技能全真模拟试卷5套装》：国家执业药师资格考试指导丛书

<<2010最新版>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>