

<<家庭安全用药提醒>>

图书基本信息

书名 : <<家庭安全用药提醒>>

13位ISBN编号 : 9787509161913

10位ISBN编号 : 7509161916

出版时间 : 柏正平 人民军医出版社 (2013-01出版)

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

<<家庭安全用药提醒>>

作者简介

柏正平，主任医师，研究生导师，湖南省中医药研究院附属医院、湖南中医药大学附属中西医结合医院院长。

现担任湖南省中医药学会副会长，中国中西医结合学会呼吸病专业委员会副主任委员，湖南省中医药学会内科专业委员会主任委员，湖南省干部保健专家，湖南省科技进步奖评审专家，湖南省自然科学系列高级职称评审专家，湖南省卫生系统高级职称评审专家。

从事中医药临床、科研、教学工作30余年，擅长运用中医和中西医结合方法防治呼吸系统疾病、消化系统疾病及恶性肿瘤。

先后承担各级各类科研课题16项；发表学术论文45篇，参编专著5部；主持中药新药“复方葶苈子胶囊”“乳核消片”的研制与开发。

<<家庭安全用药提醒>>

书籍目录

第1章 用药基本常识 怎样阅读药品说明书 怎样识别药品是否失效 如何正确购买药物 怎样做到合理用药 药品储存的注意事项 如何识别药品的有效期 家庭常用的药物剂型 服药的正确方法 正确使用肛门栓剂 服用含片的注意事项 缓释类和控释类药物的正确服用方法 如何正确看待药品说明书上的不良反应 药是否价格越贵越好 不能盲目配伍用药 “健字”“食字”与“药字”那些事 警惕“迷人”的广告药 服药不可随意停换速效药的危险 服药期间能否喝茶 服药期间能吸烟吗 哪些是国家实行特殊管理的药物 老年人用药要注意什么 药物与情绪的关系 哪些药物服用时宜多喝水 哪些药物宜清晨空腹服用 哪些药物宜餐后服用 哪些药物宜餐前服用 哪些药物宜餐时服用 宜睡前服用的药 用药与食物禁忌的注意事项 饮酒前后不能随意用药 第2章 女性用药常识 经期的用药禁忌 减肥药谁才适用 减肥药引发的健康问题 维生素E可以长期大剂量吃吗 准妈妈的安全用药常识 怀孕期间的前3个月尽量避免用药 常见孕妇需禁用的药物 慎用促排卵药物 家庭常用避孕的方法 避孕药的种类有哪些 青春痘的用药注意事项 正确使用阴道栓剂 滴虫性阴道炎需夫妻同治 产后便秘的正确用药 第3章 儿童用药常识 怎样正确计算小儿药物的用量 巧用方法——小孩吃药不再难 儿童应尽量少打针 儿童接种疫苗的相关常识 常见疫苗禁忌及不良反应 儿童的补养之道 小孩便秘慎用成人开塞露 潜伏的成人药 儿童使用哪种抗生素合适 第4章 各类疾病及家庭常用药物的用药常识 用药后需要避光的药物 长期使用后不能突然停用的药物 感冒需要使用抗生素吗 避免生活中的“药驾” 哪些人适合补钙 服用钙剂的最佳时间 怎样才能让钙剂更好地吸收 补钙需谨慎，过量损健康 怎样更好促进铁剂的吸收 补铁也不宜过量 发热后怎么正确使用退热药 应对晕车轻松自如 使用晕车药的注意事项 便秘用药谈 安眠药须慎用 止痛药使用的注意事项 服用阿司匹林的注意事项 大山楂丸服用的注意事项 胃痛能随便吃止痛药吗 消化不良时，吃药也有讲究 尿路感染用药原则与注意事项 使用哮喘喷雾剂的注意事项 止泻药的合理使用 硝酸甘油的正确服用方法 抗生素的使用原则 使用抗生素的几个误区 滥用抗生素的危害 青霉素的使用注意 使用头孢类抗生素后能饮酒吗 使用喹诺酮类抗生素的注意事项 怎样才是正确服用维生素 脂溶性维生素的特殊服法 认识糖皮质激素的常见不良反应 糖皮质激素的合理应用及不良反应防治 高血压患者服药禁忌 高血压患者服药注意事项 你的降脂药服用方法正确吗 正确认识糖尿病的克星——胰岛素 胰岛素的使用注意事项 服用二甲双胍的注意事项 糖尿病患者的降压药选择 糖尿病患者常见不能用的药物 痛风的常见用药 痛风的治疗 用药误区…… 第5章 家庭常见外用药的使用常识 附录《国家基本药物目录》（基层医疗卫生机构配备使用部分）

<<家庭安全用药提醒>>

章节摘录

版权页：在我国，男用避孕套是常用的避孕方法之一。

避孕套使用和来源都较方便，一般不需医疗人员的特殊指导，又无明显不良反应，加之避孕套在一定程度上能起到防止性病传播的作用，使用避孕套进行避孕就相对较为普遍。

使用避孕套进行避孕的效果从理论上讲是可靠的，如能坚持每次同房均能按照要求认真使用，且避孕套质量可靠，成功率可达98%以上。

2.口服避孕药 现在很多女性采取口服避孕药的方式进行避孕。

口服避孕药都是通过抑制排卵、改变子宫内膜环境、抗着床等机制而达到避孕的目的。

一般分为长效、短效、速效三类，功效可以持续不同的时间。

长效类一般1个月服用1片，服用相对比较方便；短效类需要在每个周期内每天服用且不能漏服；速效类一般在没有采取安全措施的性生活后或者其他避孕方式失败后72小时内服用。

而由于均为激素类组成，所以对女性自身的内分泌会造成一定的影响，从而带来一些不良反应，尤其是速效类避孕药，不良反应尤其严重，因此一个月经周期内只能服用1次，一年内不能超过3次。

具体的服用方法可以参考说明书。

这种方法避孕成功率相对较高，一般可达到95%以上；尤其是短效避孕药，避孕效果可达到99%以上，由于不良反应较小，并且还可以降低一些妇科疾病的发生率，同时更重要的是一种可逆的避孕方式，在停药一定时间后，不影响女性的正常生育功能，因此，比较适合未生育的女性采用。

3.手术方法 手术方法一般包括女性结扎术、男性结扎术及放置宫内节育环等。

男、女结扎术也称“绝育术”，是将女性的输卵管、男性的输精管切断或堵塞，使卵子和精子不能相遇，而达到永久避孕的目的。

这类方法由于不可逆，所以适合那些已完成生育任务或者不准备生育的妇女或男性。

此方法由于彻底隔绝了精子和卵子相遇的机会，所以也是最彻底的避孕方式。

<<家庭安全用药提醒>>

编辑推荐

《家庭安全用药提醒》主要论及了临幊上的一些常用药、常见病用幊的注意事项，特别是容易被医生和患者忽视的细节问题。

《家庭安全用药提醒》内容丰富，通俗易懂，可供家庭及医务人员参考、借鉴。

<<家庭安全用药提醒>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>