

<<孕前优生>>

图书基本信息

书名：<<孕前优生>>

13位ISBN编号：9787510104985

10位ISBN编号：751010498X

出版时间：2010-8

出版时间：国家人口计生委科技司 中国人口出版社 (2010-08出版)

作者：国家人口计生委科技司 编

页数：29

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<孕前优生>>

内容概要

《孕前优生：妇科超声检查指南》详细介绍了孕前妇科超声检查目的、检查体位、检查内容与技术、常见妇科疾病超声表现、早期妊娠超声检查要点等，供计划生育技术服务人员开展孕前优生健康检查服务时参考使用。

<<孕前优生>>

书籍目录

第一章 孕前妇科超声检查规范一、检查目的二、检查体位三、检查内容四、检查技术第二章 常见妇科疾病超声表现一、子宫发育异常二、子宫器质性疾病三、卵巢疾病四、输卵管疾病五、其他盆腔炎症性病变第三章 早期妊娠的超声检查一、检查目的二、正常早期妊娠检查项目及参数评价三、异常妊娠四、妊娠合并妇科疾病的诊断附件参考资料

<<孕前优生>>

章节摘录

版权页：插图：(2)不全流产一经确诊，应尽快行刮宫术或钳刮术。

(3)难免流产一旦确诊，应及时行刮宫术。

(4)完全流产症状消失，超声检查证实宫腔内无残留物，无感染征象，不需特殊处理。

(5)稽留流产刮宫困难，稽留时间过长可能致弥漫性血管内凝血，应转有条件的医院处理。

(6)习惯性流产妇女出现妊娠征兆时，应及时药物保胎治疗，用药至妊娠10周或超过以往发生流产的周数。

(7)双胞胎之一死亡时的处理，目前为国际上医学关注和研究的重要方向。

(8)葡萄胎一经确诊，应及时清宫，术后定期随访。

(9)侵蚀性葡萄胎及绒毛膜癌以化疗为主、手术和放疗为辅的综合治疗方法。

治疗结束后应严密随访。

(10)输卵管妊娠患者疼痛轻微、出血少，无妊娠破裂证据，血B-hCG 1000U/L且继续下降，妊娠包块直径 3cm，无腹腔内出血时，可行期待疗法。

早期输卵管妊娠要求保存生育能力的年轻患者，如无药物治疗的禁忌证，妊娠未破裂或流产，妊娠包块直径 4cm，血B-hCG 2000U/L，无明显内出血时可用化学药物治疗。

对于生命体征不稳定或有腹腔内出血征象者、诊断不明确者、异位妊娠有进展者、随诊不可靠者及期待疗法或药物治疗禁忌证者应行手术治疗。

四、妊娠合并妇科疾病的诊断妊娠早期由于子宫相对较小，诊断妇科合并症准确性优于妊娠中晚期。

1.检查项目(1)子宫形态，肌层回声。

(2)宫颈长度，宫颈内口。

(3)附件肿块。

2.检查目的(1)诊断子宫畸形。

(2)诊断子宫肌瘤、子宫肌腺症。

(3)诊断宫颈机能不全。

(4)诊断附件肿瘤。

<<孕前优生>>

编辑推荐

《孕前优生:妇科超声检查指南》：国家免费孕前优生健康检查项目用书！

<<孕前优生>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>