

<<药物处方手册>>

图书基本信息

书名：<<药物处方手册>>

13位ISBN编号：9787535772527

10位ISBN编号：7535772528

出版时间：2012-6

出版时间：湖南科技出版社

作者：陈孝治，张超，朱运贵 主编

页数：1279

字数：1470000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<药物处方手册>>

### 内容概要

根据临床实际需要遴选国内医疗卫生单位常用而疗效确切的药物共2600余种，按药理作用特点分为34章，每章节前有简要概述，随后介绍每种药物的药名、别名、制剂、作用、临床应用、用法用量、不良反应、禁用慎用及处方须知。

陈孝治、张超、朱云贵主编的《药物处方手册(第2版)》在初版的基础上删除部分已经不用的药物，如苯丙醇胺、抑肽酶等，新增加了约600种药物，其中抗生素药、循环系统用药、抗肿瘤药等部分调整幅度较大。

再版后的本手册更能满足临床需求，更能受广大读者的欢迎。

## &lt;&lt;药物处方手册&gt;&gt;

## 书籍目录

## 第一章 抗微生物药

- 第一节 抗生素
- 第二节 合成抗菌药
- 第三节 抗结核药
- 第四节 抗麻风药
- 第五节 抗真菌药
- 第六节 抗病毒药
- 第七节 中药抗菌药物

## 第二章 抗寄生虫药

- 第一节 抗疟药
- 第二节 抗阿米巴药及抗滴虫药
- 第三节 抗利什曼原虫药
- 第四节 抗吸虫药及抗丝虫药
- 第五节 驱肠蠕虫药

## 第三章 解热镇痛药、抗风湿药和抗痛风药

- 第一节 解热镇痛药及抗风湿药
- 第二节 解热镇痛药的复方制剂
- 第三节 抗风湿药
- 第四节 抗痛风药

## 第四章 镇痛药

- 第一节 麻醉性镇痛药
- 第二节 非麻醉性镇痛药
- 第三节 治疗偏头痛药

## 第五章 中枢神经兴奋药和中枢性肌肉松弛药

- 第一节 中枢神经兴奋药
- 第二节 中枢性肌肉松弛药

## 第六章 抗帕金森病(综合征)药

- 第一节 抗乙酰胆碱药
- 第二节 增加脑内多巴胺含量药
- 第三节 脑外脱羧酶抑制药
- 第四节 多巴胺受体激动药
- 第五节 单胺氧化酶抑制药
- 第六节 儿茶酚胺-氧位-甲基转移酶抑制药
- 第七节 其他药物

## 第七章 影响脑血管、脑代谢及益智药

## 第八章 拟胆碱药和抗胆碱药

- 第一节 拟胆碱药
- 第二节 抗胆碱药

## 第九章 抗癫痫药

## 第十章 镇静催眠及抗焦虑药

- 第一节 巴比妥类药
- 第二节 苯并二氮杂革类药
- 第三节 其他药物

## 第十一章 抗精神失常药

- 第一节 抗精神病药

## &lt;&lt;药物处方手册&gt;&gt;

第二节 抗抑郁药

第三节 抗躁狂药

第十二章 麻醉药及其辅助药

第一节 全身麻醉药

第二节 局部麻醉药

第三节 肌肉松弛药

第四节 麻醉拮抗药

第十三章 循环系统用药

第一节 抗心力衰竭药

第二节 抗心律失常药

第三节 抗高血压药

第四节 抗心绞痛药

第五节 抗休克药

第六节 调血脂药

第七节 抗血小板聚集药及抗血栓药

第八节 改善营养与代谢的药物

第九节 其他药物

第十四章 呼吸系统用药

第一节 镇咳药

第二节 祛痰药

第三节 平喘药

第四节 其他药物

第十五章 消化系统用药

第一节 抗酸药及抗溃疡药

第二节 胃肠解痉药

第三节 助消化药

第四节 胃肠动力药及镇吐药、催吐药

第五节 泻药

第六节 止泻药

第七节 微生态制剂

第八节 肝胆疾病辅助用药

第九节 其他药物

第十六章 泌尿系统用药

第一节 利尿药

第二节 脱水药

第三节 抗尿崩症药

第四节 抗遗尿药

第五节 治疗前列腺疾病药

第六节 治疗膀胱过度活动症药

第七节 治疗尿石症药

第八节 尿路消毒药

第九节 治疗尿毒症药

第十节 治疗勃起功能障碍药

第十七章 血液和造血系统用药

第一节 止血药

第二节 抗凝血药

第三节 抗贫血药

## &lt;&lt;药物处方手册&gt;&gt;

- 第四节 血液主要成分调节药
- 第五节 血液肿瘤相关药
- 第十八章 内分泌系统用药
  - 第一节 下丘脑—垂体激素及有关药物
  - 第二节 肾上腺皮质激素类药
  - 第三节 雄激素及同化类固醇类药
  - 第四节 甲状腺激素类药
  - 第五节 抗骨质疏松药
  - 第六节 降血糖药
  - 第七节 升血糖药
  - 第八节 抗肥胖药
- 第十九章 妇产科用药
  - 第一节 性激素类及促性腺激素类药
  - 第二节 避孕药
  - 第三节 抗早孕药
  - 第四节 子宫收缩药及保胎药
  - 第五节 促进子宫成熟药
  - 第六节 治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤药
  - 第七节 催乳药及退乳药
  - 第八节 治疗阴道炎、宫颈炎药
  - 第九节 治疗围绝经期综合征药
  - 第十节 促胎儿肺成熟药
  - 第十一节 其他药物
- 第二十章 抗肿瘤药
  - 第一节 烷化剂
  - 第二节 抗代谢药
  - 第三节 抗肿瘤抗生素
  - 第四节 抗肿瘤植物药
  - 第五节 抗肿瘤激素
  - 第六节 抗肿瘤分子靶向药
  - 第七节 其他抗肿瘤药
  - 第八节 抗肿瘤辅助用药
- 第二十一章 免疫治疗与预防药
  - 第一节 抗器官移植排斥反应药
  - 第二节 生物反应调节药
  - 第三节 免疫预防药
- 第二十二章 抗过敏药
  - 第一节 抗组胺药
  - 第二节 过敏介质阻滞药
  - 第三节 其他药物
- 第二十三章 水、电解质、酸碱平衡药及容量扩充剂、透析液
  - 第一节 输液的含义和种类
  - 第二节 常用糖、多元醇类输液和血容量扩充剂
  - 第三节 电解质调节药
  - 第四节 糖与多种电解质的混合输液(维持液)
  - 第五节 纠正酸碱平衡紊乱的药物
  - 第六节 腹膜透析液

## &lt;&lt;药物处方手册&gt;&gt;

- 第七节 血液透析液
- 第二十四章 维生素药物和微量元素类药物
  - 第一节 维生素药物
  - 第二节 微量元素类药物
- 第二十五章 酶类及其他生化制剂
  - 第一节 酶类制剂
  - 第二节 其他生化制剂
- 第二十六章 营养支持药物
  - 第一节 肠内营养
  - 第二节 肠外营养
- 第二十七章 外用消毒药
- 第二十八章 外科用药
  - 第一节 表面消毒药
  - 第二节 创面(患部)用药
  - 第三节 局部保护药物
  - 第四节 血管硬化剂
  - 第五节 灌肠及灌洗用药
  - 第六节 其他药物
- 第二十九章 皮肤科用药
  - 第一节 皮肤科外用药
  - 第二节 皮肤专科用药
- 第三十章 眼科用药
  - 第一节 抗感染药
  - 第二节 糖皮质激素类药物
  - 第三节 非甾体消炎药
  - 第四节 抗变态反应药
  - 第五节 降眼压药
  - 第六节 散瞳药
  - 第七节 促吸收药及角膜保护药
  - 第八节 眼部麻醉用药及酶类药物
  - 第九节 白内障治疗药
  - 第十节 其他药物
- 第三十一章 耳鼻咽喉科用药
  - 第一节 耳部局部治疗药
  - 第二节 鼻部局部治疗药
  - 第三节 咽喉部局部治疗药
- 第三十二章 口腔科用药
  - 第一节 龋病用药
  - 第二节 牙本质过敏用药
  - 第三节 牙髓病、根尖周病用药
  - 第四节 牙周病、黏膜病用药
- 第三十三章 解毒药
- 第三十四章 诊断用药
  - 第一节 对比剂
  - 第二节 器官功能检查用药
- 附录 常见微生物新旧名词对照表
- 外文药名索引

<<药物处方手册>>

中文药名汉语拼音索引

## &lt;&lt;药物处方手册&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页： 味布西林Furbercillin【别名】味苾西林、味脉苾青霉素。

【制剂】粉针剂（钠盐）：0.5g / 瓶，（钾盐）：0.5g / 瓶。

【作用】对铜绿假单胞菌有较强的抗菌作用，体外抑菌试验时比羧苾西林强4~16倍。

动物试验对感染的保护作用也比羧苾西林强2~3倍，对其他革兰阳性、阴性菌作用似氨苾西林。

【临床应用】主要用于铜绿假单胞菌感染，也用于大肠埃希菌、奇异变形杆菌及其他敏感菌所致感染。

【用法用量】静脉注射或静脉滴注：成人，4~8g / d，分4次，每次1~2g溶于50~100mL生理盐水，控制在0.5~1h内滴完。

极度严重感染时可加大剂量到12g / d，小儿100~150mg / (kg·d)。

【禁用慎用】对本品及青霉素药物过敏者禁用。

【不良反应】主要为消化道反应，包括恶心、纳差、胃部疼痛等，口周、面部和四肢皮肤麻木感，严重时肌颤。

【处方须知】 局部刺激性较强，且溶解度较小，故不宜肌肉注射。

使用前应做皮试。

1瓶拉曲林Piperacillin【别名】哌氨苾青霉素。

【制剂】粉针剂（钠盐）：1.0g / 瓶、2.0g / 瓶。

【作用】广谱半合成青霉素类，对革兰阳性菌的作用与羧苾西林、氨苾西林相似，对多数革兰阴性菌的作用则较强，如对铜绿假单胞菌作用比羧苾西林强。

【临床应用】用于铜绿假单胞菌、变形杆菌属、肺炎克雷伯菌肺炎亚种、大肠埃希菌及厌氧菌等所致的各种感染。

【用法用量】 肌肉注射：1g / 次，3~4次 / d，用生理盐水、注射用水或0.25%利多卡因注射液溶解。

静脉注射：成人4~12g / d，严重感染可用至10~24g / d。

儿童80~200mg / (kg·d)，均分3~4次。

静脉滴注：剂量与静脉注射同，用生理盐水、5%葡萄糖注射液、葡萄糖氯化钠注射液配成2%浓度在0.5~1h内滴完。

【不良反应】少见，主要有皮疹、皮肤瘙痒，少数患者可有药物热。

偶有头晕、麻木、血尿及一过性肝功能异常和血常规改变，一般不影响继续用药。

【禁用慎用】对青霉素类药物过敏者禁用。

血小板减少症、胃肠道溃疡患者使用本品，可能增加凝血机制障碍和出血的危险，应慎用。

【处方须知】 静脉注射速度不宜过快，否则可致恶心、咳嗽、发热、口腔异味、眼结膜充血、胸部不适等。

与氨基苷类或头孢菌素类抗生素合用有协同作用，但与前者不宜混合注射。

<<药物处方手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>