

<<实用中草药彩色图集（第2册）>>

图书基本信息

书名：<<实用中草药彩色图集（第2册）>>

13位ISBN编号：9787535911056

10位ISBN编号：7535911056

出版时间：1993-12

出版时间：广东科技出版社

作者：罗献瑞

页数：506

字数：455000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<实用中草药彩色图集（第2册）>>

内容概要

本图集以实用为宗旨，故植物药、动物药和矿物药兼收并蓄，并取图文对照形式编排。

全书共收载中草药720余种，彩图730余幅，分三册出版。

第一册收录207种，以华南地区常用中药为主，其中相当部分为该地区习惯用药，故有一定的地区特色。

第二册收录230种，全为植物药，主要是我国南部、东部和中部疗效较确切的民间草药和部分中药，故该册对热心研究民间草药的人士特别有用。

第三册收录280种，其中动物药约80种，矿物药约40种，并于植物药中选收我国产名贵中药近20种及部分进中药材。

这些内容在通常所见普及性中草药书籍中尚不多见，故可补其不足。

<<实用中草药彩色图集(第2册)>>

作者简介

石仙桃

别名 石橄榄

来源 本品为兰科植物石仙桃*Pholidota chinensis* Lindl. 的干燥全草。

原植物石仙桃(图25)为多年生附生草本；根状茎粗壮；假鳞茎卵形或梭形，肉质，大小不一，通常长2.5~6厘米，宽1~2.5厘米，顶生2叶。

叶倒卵形或倒卵状椭圆形，长10~18厘米，宽3~7厘米，顶端短尖，基部渐狭成柄，有较明显的弧形脉3~5条。

4~5月开花。

花葶生于假鳞茎顶端，长12~38厘米，先叶发出，总状花序具8~20朵疏离的花，花序轴稍曲折；苞片在花未开时二列套叠；花白色或带黄色，芳香；萼片3，卵形；花瓣与萼片等长，线状披针形，唇瓣凹陷或基部呈囊状，3裂，长约8毫米；蕊柱长4~5毫米，顶端翅状。

附生于树上或岩石上。

分布我国东南部至南部。

采收加工 全年可采。

拔取全株，洗净，用热水烫后，晒干。

药材性状 本品根状茎粗短，匍匐状，覆有膜质鳞片状叶，每隔1~2厘米，生有一假鳞茎，其下有须根1~2条。

假鳞茎干时缩成条状或纺锤状，有不规则的纵皱纹和纵沟纹，顶端有芽痕或叶痕，灰黄色或黄褐色，有时绿黄色；质韧，断面灰白色。

叶片与假鳞茎常分离，卷曲或折迭，灰黄色。

味淡，气无或微。

以假鳞茎肥厚、断面白色、根状茎和须根少者为佳。

性味和功用 甘、淡。

凉。

清热，化痰止咳，滋阴，润肺生津。

用于肺结核咯血，咳嗽，风火牙痛，小便不利等。

常用量8~20克；鲜品 适量。

田基黄

别名 地耳草。

来源 本品为金丝桃科植物田基黄*Hypericum japonicum* Thunb. 的干燥全草。

原植物 田基黄(图26)为一年生草本；茎直立，纤细，草质，高10~30厘米。

叶对生，无柄，卵形或卵状披针形，长7~10毫米，宽1.5~6毫米，顶端钝，基部不明显心形，抱茎，全缘，背面有稀疏的黑色小斑点；基出叶脉5条。

花夏季开放，黄色，直径约6毫米，排成顶生聚伞花序；化梗长5~10毫米；萼片和花瓣均5片，近等长；雄蕊多数，化丝丝状，基部合生；心柱3枚，柱头头状。

蒴果椭圆形，长约4毫米，成熟时室间开裂成3果瓣；种子无翅。

<<实用中草药彩色图集(第2册)>>

多生于田边、沟边潮湿地上。
分布于我国东南部、南部和西南部各省区。
业洲东南部至澳大利亚均有。

采收加工 春、夏二季开花时采收。
拔取全草，除去杂质，晒干。

药材性状 本品全长20~30厘米或偶有更长。
根须状，黄褐色。

茎 单一或基部分枝，近方柱形，黄绿色或暗棕色；质脆，易折断，断面中空。

叶对生，无柄；叶片常卷缩，展平卵形或卵圆形，长0.4~1厘米，基部抱茎，全缘，黄色或黄棕色，具腺点，基出脉3~5条。

聚伞花序顶生；花小，黄色；萼片、花瓣均为5片。

无臭，味微苦。

以色黄绿、带花者为佳。

性味和功用 苦、辛，平。

归肝经。

清利湿热，散瘀消肿。

用于急、慢性肝炎，疮疖痈肿，毒蛇咬伤。

用量9~15克。

白花丹

别名 一见消。

来源 本品为白花丹科植物白花丹 *Plumbago zeylanica* Linn. 的干燥嫩枝叶。

原植物 白花丹(图27)为攀援状亚灌木；茎绿色，有密的线纹，髓白色。

叶纸质，互生，卵形至卵状椭圆形，长3~8厘米或过之，顶端短尖或渐尖，基部阔楔形而下延，两面无毛；叶柄短，基部抱茎。

冬季开花。

穗状花序生于枝顶，总花梗长5~15毫米，花序轴长2~8厘米，具腺毛，苞片卵形；花萼长约11毫米，宽约2毫米，裂片5。

外面被头状腺毛；花冠高脚碟状，白色或淡蓝色，筒部长约2厘米，檐部长约7毫米；雄蕊与冠筒近等长，花药长约2毫米，蓝色；子房长圆形，花柱细长，顶5裂。

蒴果长圆形，长5~7毫米，成熟时上部5裂。

生于村旁荒地或疏林下。

分布我国东南部至西南部各省区。

东南亚各地均有。

采收加工 全年可采。

割取带叶嫩茎枝，切段，晒干。

药材性状 本品茎枝多已切成长3~5厘米的短段，圆柱形，有细线棱，灰绿色至灰黄质；质坚可折断。

<<实用中草药彩色图集(第2册)>>

断面黄白色,纤维质,有白色的髓或中空。

叶皱缩或切碎,灰绿色,完整的叶为卵形或卵状椭圆形,纸质,光滑无毛,叶柄稍抱茎。

气微,味微苦涩。

以叶多,色灰绿,茎枝幼嫩者为佳。

性味和功用 辛、苦、涩,凉。

有毒。

功能祛风止痛。

清热,消肿散瘀。

用于风湿关节疼痛,目赤肿痛,血瘀经痛,跌打损伤,肿痛,恶疮,疥癣。

常用量5~10克。

外用适量,煎水洗或鲜品捣烂敷患处。

白眉草

别名 一枝香、白薇。

来源 本品为菊科植物毛大丁草*Gerbera piloselloides*(Linn.)Cass.的干燥全草。

原植物毛大丁草(图28)为多年生草本,具短而粗的根状茎。

叶纸质,莲座状着生。

倒卵形或倒卵状长圆形,长6~16厘米。

宽2.5~5.5厘米,顶端圆,基部渐狭或钝。

全缘,上面被疏硬毛或无毛,下面密被蛛丝状绵毛,有缘毛;倒脉6~8对,叶柄长1~7厘米,被绵毛。

头状花序单生于花葶之顶,直径2.5~4厘米;总苞盘状,总苞片二层,线形或线状披针形,背面被锈色绒毛,花夏季开,白色,外围雌花2层,外层舌状,内层管状二唇形,中央两性花多数,管状,檐部扩大。

瘦果纺锤形,具6棱,被白毛,长4.5~6毫米,顶端具长喙。

冠毛长约11毫米,基部联合成环状。

生于林缘、草丛中或旷野荒地上。

分布我国南部各省区。

亚洲东南部、大洋洲及非洲均有。

采收加工 春、夏季开花后,拔起全株,抖净泥沙,晒干。

.....

<<实用中草药彩色图集 (第2册)>>

书籍目录

一 全草类 一枝黄花 丁葵草 九层塔 九节茶 九里明 九头狮子草 三白草 土茵陈 广东土荆芥 马鞭草
马齿苋 大飞扬草 大金牛草 大驳骨丹 小飞扬草 山薄荷 火炭母 天香炉 凤尾草 水蜈蚣 六耳铃 毛麝
香 石上柏 石见穿 石仙桃 田基黄 白花丹 白眉草 半边旗 半枝莲 半边莲 甘茶蔓 仙鹤草 塘葛菜 羊蹄
草 自扣草 血见愁 防风草 红水葵 红丝线 过天网 声色草 荠菜 泽兰 佩兰 狗肝菜.....二 根和根状茎
类三 茎、枝和树皮类四 叶类五 花类六 果实和种子七 树脂和其它类八 藻类和菌类

<<实用中草药彩色图集（第2册）>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>