

<<升级版>>

图书基本信息

书名：<<升级版>>

13位ISBN编号：9787543954212

10位ISBN编号：7543954214

出版时间：2012-8

出版时间：上海科学技术文献出版社

作者：管阳太 编

页数：176

字数：134000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<升级版>>

内容概要

《挂号费丛书：专家诊治癫痫（升级版）》10余万字，包括数百条目，或以问诊方式，一问一答，十分明确；或分章节段落，一事一叙一目了然。

## 作者简介

管阳太，男，现任第二军医大学附属长海医院神经科主任，神经精神病学教研室主任，主任医师，教授、博士生导师，上海科学院上海市脑血管病防治研究所所长，上海老龄科学研究中心中风防治研究所所长，上海市医学“领军人才”、“曙光学者”与“浦江人才”。

兼任中华医学会神经病学分会委员，中国免疫学会神经免疫学分会委员，上海老年学会老年脑血管病防治专业委员会主任委员，上海市医学会神经内科专业委员会副主任委员，上海市中西医结合学会神经科专业委员会副主任委员，上海市中医药学会络病分会副主任委员，全军神经内科专业委员会常务委员，上海市神经科学学会理事，上海市医学会脑卒中分会委员等职。

主要擅长脑血管病神经免疫性疾病、癫痫等疾病的诊断与治疗。

主持与参加的科研项目，多次荣获全军上海市、第二军医大学科研成果嘉奖。

发表了10余篇SCI医学论文，出版了《中风患者必读》等多部专著，并担任多种专业医学期刊的编委。

<<升级版>>

书籍目录

- 总序
- 患了癫痫主要有哪些症状
- 病人发生抽搐就是患了癫痫病吗
- 何谓癫痫
- 患了癫痫有哪些特征
- 中医学认为癫痫发作有哪些症状
- 癫痫发作时神志会丧失吗
- 癫痫发作与抽搐动作有关吗
- 何谓原发性癫痫
- 何谓继发性癫痫
- 癫痫疾病有哪些分类方法
- 什么是部分性发作
- 什么是单纯部分性发作
- 什么是复杂部分性发作
- 什么是自动症
- 什么是全面性发作
- 什么是失神发作
- 什么是失神持续状态
- 什么是大发作
- 什么是强直性发作
- 什么是阵挛性发作
- 什么是肌阵挛发作
- 什么是失张力发作
- 什么是癫痫综合征
- 什么是癫痫持续状态
- 什么是杰克森（Jackson）癫痫
- 什么是难治和耐药性癫痫
- 什么是月经性癫痫
- 什么是青少年肌阵挛癫痫
- 什么是原发性阅读性癫痫
- 什么是青少年原发性强直
- 什么是获得性癫痫失语
- 什么是儿童良性中央回癫痫
- 什么是婴儿重症肌阵挛性癫痫
- 什么是托德（Todd）瘫痪
- 什么是反射性癫痫
- 什么是额叶癫痫
- 什么是颞叶癫痫
- 什么是顶叶癫痫
- 什么是枕叶癫痫
- 什么是脑外伤癫痫
- 什么是老年癫痫
- 什么是韦斯特（West）综合征
- 什么是伦一格（Lennox-Gastaut）综合征
- 什么是头痛型癫痫

<<升级版>>

什么是腹型癫痫  
什么是枕区放电的良性儿童癫痫  
热性惊厥会发展为癫痫吗  
儿童患癫痫有哪些特点  
什么是痴笑性发作  
什么是伴或不伴失神的眼肌阵挛性发作  
什么是婴儿游走性部分性发作  
什么是惊吓性癫痫  
什么是家族性颞叶癫痫  
什么是间脑癫痫  
什么是晚发性癫痫  
痫性发作和癔症发作有何区别  
癫痫对儿童智能有哪些影响  
患了癫痫需进行哪些项目诊断检查  
癫痫病人应掌握哪些基础医学知识  
医生对癫痫病人会进行哪些诊断治疗  
经医生诊断治疗后病人应怎样进行康复  
挂号费丛书·升级版总书目

## 章节摘录

版权页： 癫痫药物治疗是目前治疗癫痫最主要的治疗方法，服用抗癫痫药物时要注意服药剂量和服药时间。

平时用药，如果是一天3次，人们理解为早、中、晚3次跟着三餐走，但是这个时间对抗癫痫药来说是不科学的。

人们一般用餐时间在早上7时到下午6时之间，如果服用抗癫痫药物时间和用餐时间同步，那么药物主要在白天吸收，白天血液中的癫痫药物的浓度比较高，不良反应也随之增加；夜间由于长时间没有药物进入体内，导致血中的药物浓度过低，甚至不能达到抗癫痫的作用，从而影响药物的疗效。

更甚者有可能因药量低达不到控制发作的界限，以至于某些病人夜间经常癫痫发作。

应科学服用抗癫痫药物。

维持癫痫药物浓度平均值为保证体内癫痫药物维持在有效浓度内，如果每日3次，正确服药时间间隔为8小时一次。

如果每日两次，每隔12小时服药一次。

有肠胃疾病的病人服药前需加餐，某些抗癫痫药物的说明书会注明：餐前（或空腹）、餐后或餐时服用，这使病人产生一些误解。

其实，餐前指的是在餐前半小时至1小时，空腹指的是进餐2~4小时后即可。

注明餐后或餐时服用，多是因为此类药物对消化道有刺激性，食物可减轻这种不适；或是因为食物中的脂类物质有利于药物的吸收。

服用癫痫药物时，若服药时间与就餐时间间隔太久，可在服药前少量地吃些点心。

胃不好的病人可以先吃一点食物再吃药，以避免药物伤胃。

除了抗癫痫药，还有一些其他的药物，如抗生素、治疗震颤麻痹的药物等药理药性和抗癫痫药很相似，如果按照一日三餐的时间来服药，会影响药效。

癫痫病人对服药剂量、服药时间等都需要咨询主治医生，在医生的指导下用药，能够做到安全用药。何谓抗癫痫药物血浓度和稳态血浓度 癫痫病人服用抗癫痫药物期间，医生经常要化验血药浓度，并根据血药浓度调整剂量。

抗癫痫药物血药浓度是指在血浆中药物的含量，临床上真正起抗癫痫作用的是游离药物的血浓度。

稳态血浓度是指多次定时、定量、规律服药后药物的吸收量与排泄量接近相等时的血浓度。

药物达到稳态浓度的时间一般大约是该药的5个半衰期。

如在一定的时间内用药总量不变，改变服药次数一般不影响达到稳态的速度和浓度。

但减少服药次数会使该药浓度波动加大。

有效血浓度是指抗癫痫药物能完全或大部分控制癫痫发作，临床又没有中毒症状或没有不可耐受的不良反应的血药浓度，也就是达到治疗效果的稳态血药浓度范围。

临床医生根据这个浓度调整剂量，指导治疗。

<<升级版>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>