

<<新编护士用药手册>>

图书基本信息

书名：<<新编护士用药手册>>

13位ISBN编号：9787565900167

10位ISBN编号：7565900168

出版时间：2010-10

出版单位：北京大学医学出版社

作者：苏利群，王静芬，苏志成 主编

页数：748

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新编护士用药手册>>

内容概要

护理工作 在医疗中，特别是在药物治疗中，对恢复患者的健康所起的作用举足轻重。因此，护理人员除了需具有对患者的爱心和责任心外，还必须熟悉药物与患者之间的密切而具体的关系，即需具备患者所患疾病的知识，了解患者的各种状态，掌握医师医嘱及处方中药物的知识，如药物的性质、用法、用量等，以便正确使用药物，并观察和告知患者药物的疗效和不良反应等，甚至在出现紧急情况时采取必要的措施，这样，才能使药物的治疗效果得以充分发挥。

由苏利群和王静芬所编著的《新编护士用药手册》，内容丰富，尤其是突出“用药护理注意”和“用法”，对护理人员临床用药具有指导作用；手册采用小开本，便于携带查阅。本书的出版定能受到护理工作者的欢迎，并在提高护理质量方面起到积极的作用。

<<新编护士用药手册>>

书籍目录

一、抗微生物药 (一)青霉素类 青霉素钠(钾)(1)普鲁卡因青霉素(3)苄星青霉素(3)青霉素V钾(4)苯唑西林钠(5) 氯唑西林钠(5)双氯西林(6)氟氯西林(6)氨苄西林钠氯唑西林钠(7)氨苄西林钠(7) 羧苄西林钠(8)阿莫西林(9)阿莫西林/氟氯西林(10)阿莫西林/双氯西林(10)哌拉西林 林钠(10)美洛西林钠(11)阿洛西林钠(11)磺苄西林钠(12)替卡西林(12)仑氨西林 (12)巴氨西林(13)匹氨西林(13)味布西林(13)替莫西林(13)美西林(14) (二)头孢菌素类 (三)其他 β-内酰胺类 (四) β-内酰胺酶抑制剂及其复方制剂 (五)氨基糖苷类 (六)四环素类 (七)氯霉素类 (八)大环内脂类 (九)多肽类 (十)其他抗菌抗生素 (十一)磺胺类和甲氧苄啶 (十二)喹诺酮类 (十三)其他抗微生物药 (十四)抗结核病药 (十五)抗麻风病药 (十六)抗真菌药 (十七)抗病毒药二、抗寄生虫病药三、抗肿瘤药物四、主要作用于中枢神经系统的药物五、作用于传出神经系统的药物六、麻醉药及其辅助药物七、主要作用于循环系统的药物八、主要作用于呼吸系统的药物九、主要作用于消化系统的药物十、主要作用于泌尿系统的药物十一、作用于血液及造血系统的药物十二、抗变态反应药十三、内分泌系统药十四、妇产科用药十五、维生素类十六、调节水、电解质及酸碱平衡十七、钙、磷代谢调节药十八、营养药十九、免疫调节药物二十、减肥药二十一、消毒防腐药二十二、皮肤科用药二十三、诊断用药二十四、解毒药二十五、生物制品附录

<<新编护士用药手册>>

章节摘录

阿立哌唑（博思清、奥派）用于精神分裂症。

致恶心、头痛、嗜睡、轻度锥体外系症状、体位性低血压等，禁饮酒。

片、口腔崩解片：口服：第1周起始量5mg/d，第2周10mg/d，第3周15mg/d 1次/日，不超过30mg/d，清晨或睡前服。

口腔崩解片只需少量水，借吞咽动作入胃起效。

洛沙平（克塞平）用于精神分裂症、偏执症状、焦虑症。

致恶心、呕吐、心悸、锥体外系反应等，使尿液红染，属正常现象。

片、胶囊：10mg、25mg。

口服：开始20～50mg/d，渐增至100-200mg/d，分2～4次服。

帕利哌酮Paliperidone（芮达）用于精神分裂症急性期。

致静坐不能和锥体外系障碍等，会增高痴呆相关性精神病老年患者的死亡率。

缓释片：3mg、6mg、9mg。

口服：每次6mg，1次/日，早晨服用，整片吞服，服药不受进食影响。

五氟利多Penfluridol治慢性精神分裂症。

致锥体外系反应，偶见皮疹、抽搐、心电图改变，肝肾功能不全禁用，孕妇慎用，禁饮酒

<<新编护士用药手册>>

编辑推荐

《新编护士用药手册(第3版)》：收载1800多种药，销量超过4万册。

<<新编护士用药手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>