

<<基层计划生育临床技术>>

图书基本信息

书名：<<基层计划生育临床技术>>

13位ISBN编号：9787800791543

10位ISBN编号：7800791548

出版时间：1993-8

出版时间：中国人口出版社

作者：孟石河，张明珠 编

页数：235

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<基层计划生育临床技术>>

### 内容概要

计划生育是牵动着我国十一亿人口泱泱大国富强康乐、人人幸福的大事，也是延系我炎黄子孙各民族共同兴旺、福祉长远的大事。

当前我国的计划生育和人口政策包括“控制人口数量，提高人口素质”，简言之即“少生、优生”，这是当前的最佳选择。

少生就需要优生，优生才可能少生，这是计划生育工作的两侧面，缺一不可，是辩证统一的。

计划生育不仅是强国富民的一项“人口政策”，也是个人幸福的一项“家庭计划”，唯此而已，岂有它哉？

可惜不少好心人或有心人，远远地在那里指手划脚，殊不知发展中的中国人民誓要尽快地摆脱贫穷，要早日过上“文明生活”，这难道不是作为人的生存与发展最起码和最迫切的权利？

## <<基层计划生育临床技术>>

### 书籍目录

前言第一章 节育手术基础第一节 基层手术室一、基层手术室的设置（一）手术室的位置（二）手术室内部的要求（三）手术室的管理二、手术室的工作原则及制度（一）手术室的工作原则（二）手术室工作制度三、手术器械和物品的准备（一）手术器械（二）敷料（三）手术巾及手术衣（四）其它手术用品四、消毒、灭菌（一）手术室空气消毒（二）手术器械、敷料的灭菌与消毒五、施术人员的准备（一）更换手术衣（二）洗手（三）穿戴手套和手术衣六、手术区皮肤的准备（一）备皮（二）消毒（三）注意事项第二节 手术基本功训练一、常用器械、物品与正确用法二、手术基本操作技术（一）显露（二）切开和分离（三）止血（四）打结与剪线（五）缝合与拆线第三节 手术前后的处理一、术前准备二、术后处理第四节 麻醉的概念和节育手术的常用麻醉方法一、麻醉的概念和分类二、计划生育手术常用的麻醉方法（一）常用的局部麻醉药（二）局部浸润麻醉操作技术（三）局麻药的毒性反应、过敏反应及处理第二章 医学基础知识第一节 生殖系统解剖生理学基础一、男性生殖系统解剖（一）睾丸（二）附睾（三）输精管和射精管（四）精囊腺和前列腺（五）阴囊.....第三章 女性节育技术与临床第四章 男性节育技术与临床第五章 医学遗传学基础知识第六章 不孕症

## <<基层计划生育临床技术>>

### 章节摘录

指输精管结扎术后两周内发生的皮肤入口、精索的炎症以及由此而引起的附睾、输精管、前列腺、精囊腺等部位的急性炎症。

按炎症波及的部位不同,可分为入口感染、精索炎、前列腺炎和精囊炎等。

引起感染的原因较多,常见的原因是手术环境被污染、器械灭菌不彻底、术区皮肤消毒不认真或手术操作过程中污染术野。

术后入口处包扎保护不妥也是引起感染的原因之一。

国内某些地方曾在被绿脓杆菌污染的换药室里进行输精管结扎手术,导致术后成批感染,并引起了不良后果。

因此,施术人员要有高度的责任感,严格无菌观念,把握手术质量关,确保受术者的安全。

1.皮肤入口感染临床表现为术后皮肤入口局部出现红、肿,热、痛等表现,有时可有炎性分泌物溢出,甚至出现化脓征象。

2.精索炎当炎症波及到精索时,可引起患侧阴囊内囊胀痛,并沿精索走向放射,甚至可放射到下腹部及下腰部。

检查时精索增粗,边界不清,触痛明显。

如炎症波及到精索附睾端及附睾,可出现急性附睾炎的临床表现。

(三)痛性结节 结扎术后3个月之内,结扎局部由于手术创伤引的无菌性炎性反应,形成一个小结节,属正常现象。

结扎术后3个月以上,结节仍存在并有可信性的疼痛和压痛者,为疼性结节。

.....

<<基层计划生育临床技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>