

<<李时珍医学全书>>

图书基本信息

书名：<<李时珍医学全书>>

13位ISBN编号：9787800894732

10位ISBN编号：7800894738

出版时间：1999-8-1

出版时间：中国中医药出版社

作者：柳长华

页数：1699

字数：2736000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<李时珍医学全书>>

内容概要

李时珍（公元1518～1593年），字东璧，号濒湖，蕲州人。

李时珍是明代以来有重要影响的一位医药学家，他临床经验丰富，重视对本草学的研究，一生著述颇多。

根据书目与文献的记载，著有《本草纲目》《奇经八脉考》《濒湖脉学》《命门考》《三焦客难》《濒湖医案》《濒湖集简方》《五藏图论》等。

本书乃将李氏存世的《本草纲目》《奇经八脉考》《濒湖脉学》三种，汇为一编，名为《李时珍医学全书》。

<<李时珍医学全书>>

书籍目录

本草纲目序例第一卷 序例上 历代诸家本草 引据古今医家书目 引据古今经史百家书目 采集诸家本草
药品总数 神农本草经名例 陶隐居名医别录合药分剂法则 采药分六气岁物 七方 十剂 气味阴阳 五味宜
忌 五味偏胜 标本阴阳 升降浮沉 四时用药例 五运六淫用药式 六腑六脏用药气味补泻 五脏五味补泻
脏腑虚实标本用药式 引经报使本草纲目序例第二卷 序例下 药名同异 相须相使相畏相恶诸药 相反诸
药 服药食忌 妊娠禁忌 饮食禁忌 李东垣随证用药凡例 陈藏器诸虚用药凡例 张子和汗吐下三法 病有
八要六失六不治 药对岁物药品 神农本草经目录 宋本草旧目录本草纲目主治第三卷 百病主治药上 诸
风 痉风 项强 癩痢 卒厥 伤寒热病 瘟疫 暑 湿 火热 诸气 痰饮 脾胃 舌酸嘈杂 噎膈 反胃 呕吐 哕
呃逆 霍乱 泄泻 痢 疟 心下痞满 胀满 诸肿.....本草纲目人部第五十二卷

<<李时珍医学全书>>

章节摘录

如梧子者，以二大豆准之。

如弹丸及鸡子黄者，以四十梧子准之。

[宗奭曰]今人用古方多不效者何也？

不知古人之意尔。

如仲景治胸痹，心中痞坚，逆气抢心，用治中汤。

人参、术、干姜、甘草四物，共一十二两，水八升，煮取三升，每服一升，日三服，以知为度。

或作丸，须鸡子黄大，皆奇效。

今人以一丸如杨梅许服之，病既不去，乃曰药不神。

非药之罪，用药者之罪也。

凡方云巴豆若干枚者，粒有大小，当去心皮秤之，以一分准十六枚。

附子、乌头若干枚者，去皮毕，以半两准一枚。

枳实若干枚者，去瓢毕，以一分准二枚。

橘皮一分准三枚。

枣大小三枚准一两。

干姜一累者，以一两为正。

凡方云半夏一升者，洗毕秤五两为正。

蜀椒一升，三两为正。

吴茱萸一升，五两为正。

菟丝子一升，九两为正。

庵[+闾]子一升，四两为正。

蛇床子一升，三两半为正。

地肤子一升，四两为正。

其子各有虚实轻重不可秤准者，取平升为正 凡方云用桂一尺者，削去皮重半两为正。

甘草一尺者，二两为正。

云某草一束者，三两为正。

云一把者，二两为正。

凡方云蜜一斤者，有七合。

猪膏一斤者，有一升二合也。

凡丸散药，亦先切细暴燥乃捣之。

有各捣者，有合捣者，并随方。

其润湿药，如天门冬、地黄辈，皆先增分两切暴。

独捣碎更暴。

若逢阴雨，微火烘之，既燥，停冷捣之。

[时珍曰]凡诸草木药及滋补药，并忌铁器，金性克木之生发之气，肝肾受伤也。

惟宜铜刀、竹刀修治乃佳。

亦有忌铜器者，并宜如法。

丸散须用青石碾、石磨、石臼，其砂石者不良。

凡筛丸散，用重密绢，各筛毕，更合于臼中，捣数百遍，色理和同，乃佳也。

巴豆、杏仁、胡麻诸膏腻药，皆先熬黄，捣合如膏，指[扌蔑]莫结切。

视泯泯，乃稍稍入散中，合研捣散，以轻疏绢筛度之，再合捣匀。

凡煮汤，欲微火令小沸。

其水依方，大略二十两药，用水一斗，煮取四升，以此为准。

然利汤欲生，少水而多取汁；补汤欲熟，多水而少取汁。

不得令水多少。

用新布，两人以尺木绞之，澄去泥浊，纸覆令密。

<<李时珍医学全书>>

温汤勿用铁器。

服汤宁小沸，热则易下，冷则呕涌。

[之才曰]汤中用酒，须临熟乃下之。

[时珍曰]陶氏所说，乃古法也。

今之小小汤剂，每一两用水二瓯为准，多则加，少则减之。

如剂多水少，则药味不出；剂少水多，又煎耗药力也。

凡煎药并忌铜铁器，宜用银器瓦罐，洗净封固，令小心者看守，须识火候，不可太过不及。

火用木炭、芦苇为佳。

其水须新汲味甘者，流水、井水、沸汤等，各依方，详见水部。

若发汗药，必用紧火，热服。

攻下药，亦用紧火煎熟，下消、黄再煎，温服，补中药，宜慢火，温服。

阴寒急病，亦宜紧火急煎服之。

又有阴寒烦躁及暑月伏阴在内者，宜水中沉冷服。

凡渍药酒，皆须细切，生绢袋盛，入酒密封，随寒暑日数漉出。

滓可暴燥，微捣更渍，亦可为散服。

[时珍曰]别有酿酒者，或以药煮汁和饭，或以药袋安置酒中，或煮物和饭同酿，皆随方法。

又有煮酒者，以生绢袋药入坛密封，置大锅中，水煮一日，埋土中七日，出火毒乃饮。

凡建中、肾沥诸补汤，滓合两剂，加水煮竭饮之，亦敌一剂，皆先暴燥。

[陈藏器曰]凡汤中用麝香、牛黄、犀角、羚羊角、蒲黄、丹砂、芒消、阿胶辈，须细末如粉，临时纳汤中，搅和服之。

.....

<<李时珍医学全书>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>