第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

图书基本信息

书名：<<宝宝意外伤害防救全方案>>

13位ISBN编号：9787802039100

10位ISBN编号：780203910X

出版时间：2012-7

出版时间：中国妇女出版社

作者：王言 编著

页数：262

字数：233000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

内容概要

意外伤害是我国0~14岁儿童的第一位死因，超过4种儿童常见疾病死因的总和，目前已被公认为重大的公共卫生问题。
过去人们认为伤害是无法避免、不可预防的，因此称为“意外伤害”，而发达国家的成功经验已经证明：伤害可以预防。
对学前儿童来说，父母的养护安全意识对预防伤害的发生极为重要。
可惜的是，由于养育传统和安全素质的缺乏，不少父母重养育、轻安全，对生活中无处不在的安全隐患熟视无睹。

本书全面梳理0~6岁儿童在养育、护理、游戏、活动等各方面的安全隐患，教给父母应对宝宝意外伤害的方法，是父母必备的安全育儿大全。

第一图书网, tushu007.com

作者简介

王 言
二十余年前毕业于北京医科大学，毕业后一直从事科技期刊和科普期刊的编辑工作，有十数年的育儿类期刊撰稿、编辑、策划经验，参办的期刊曾获卫生部优秀期刊奖。

坚信“养育好孩子”是每一个普通家庭最重要的大事，因此，十数年来作为母亲，更加敬业，将养育女儿作为最重要的事业。

第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

书籍目录

第一篇 1~3个月宝宝意外伤害防救方案
1~3个月宝宝生长发育特点
新生宝宝的睡眼安全
宝宝睡眠意外之预防第一
“蒙（捂）被综合征”之紧急处理
新生宝宝的哺喂安全
宝宝哺喂意外之预防第
呛奶宝宝之紧急处理
新生宝宝的洗澡安全
宝宝洗澡意外之预防第一
宝宝轻度烫伤之紧急处理
新生宝宝可能遇到的其他意外
新生儿的外出安全
治疗臀红引发的意外
热水袋意外
萘中毒
细线缠住小手指
宠物安全
翻不出来的婴儿床
宝宝坠床意外之预防第一
宝宝坠床之紧急处理
甲醛幼童综合征
宝宝甲醛中毒之典型案例
宝宝甲醛中毒之预防第一
甲醛中毒的可能表现
急性甲醛中毒之紧急处理
一氧化碳中毒仍在发生
宝宝一氧化碳中毒之预防第一
宝宝一氧化碳中毒之紧急处理
婴儿摇晃综台征
婴儿摇晃综合征之预防第一
婴儿摇晃综合征之紧急处理
虫虫入耳惊险
虫虫入耳之预防第一
虫虫入耳之紧急处理
恼人的蚊子
蚊子叮咬宝宝之预防第一
蚊子叮咬宝宝之紧急处理
第二篇 4~6个月宝宝意外伤害防救方案
4~6个月宝宝的动作发育特点
小心婴儿车也会倾覆
婴儿车意外之预防第一
婴儿车意外之紧急处理
药，可不能能吃多
宝宝服药过量之预防第一

第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

宝宝服药过量之紧急处理
选用小儿专用药品
服药过量之典型案例1：多喝了止咳糖浆
服药过量之典型案例2：多吃了驱虫药
小宝宝乘私家车出行蜜全
宝宝私家车出行安全之预防第一
宝宝私家车出行意外之紧急处理
人工口对口呼吸法实施步骤
心脏按摩
爸爸的“闻祸游戏”
闯祸游戏意外之预防第一
闯祸游戏意外之紧急处理
第三篇 7~9个月宝宝意外伤害防救方案
7~9个月宝宝的动作发裔特点
“灌药”是个危险动作
宝宝灌药意外之预防第一
宝宝灌药意外之紧急处理
安抚奶嘴的意外
安抚奶嘴意外之预防第一
安抚奶嘴意外之紧急处理
安抚奶嘴上的绳子勒住脖子
小鼻孔不能进异物
鼻腔异物之典型案例
宝宝鼻腔异物之预防第一
宝宝鼻腔异物之紧急处理
……
第四篇 10～12个月宝宝意外伤害防救方案
第五篇 1岁宝宝意外伤害防救方案
第六篇 2岁宝宝意外伤害防救方案
第七篇 3岁宝宝意外伤害防救方案
第八篇 4～6岁宝宝意外伤害防救方案
主要参考文献

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

插图：新生儿头相对较大，大脑皮质兴奋性低，睡眠时间长，新生儿一昼夜睡18～22小时。
随着月龄的增长，活动时间逐渐增加，睡眠时间则相对减少。
新生儿皮下脂肪较薄，体表面积相对较大，容易散热，新生儿对寒冷的反应与成人不同，受冷时无颤抖反应，而依赖棕色脂肪产热。
室温过高时，足月儿能通过皮肤出汗增加散热，如果体内水分不足，则易发生“脱水热”。
新生儿由于体温调节不够完善，天冷时须防止受冷，注意保暖。
天热时须防止受热，要注意通风。
新生儿皮肤角质层薄，易擦伤而致细菌感染，严重者可发展成败血症，因此，皮肤的清洁卫生很重要。
头、颈、腋窝、会阴部及其他皮肤皱褶处应勤洗，以免糜烂。
每次换尿布后，特别在大便后应以温水冲洗臀部，用清洁纱布或软毛巾吸干，以防尿布疹。
脐带脱落后可用浴盆洗澡。
新生儿的脐带经无菌操作结扎后，逐渐干燥，一般在生后1～7天内脱落。
2个月的小宝宝，“脖子”已经变得很“硬”了，妈妈在竖着抱宝宝的时候，他的身体可以挺得很直，头能随视线转动。
当然，挺直脖子的时间可能不够长，就会变得有点“摇头晃脑”。
但宝宝的视力开始变得比较集中，能随着视野内的物体移动，能把头转向有声音的方向。
能拿住放在手里的东西。
一双小手不停地动啊动，高兴时，活动的幅度尤其大，甚至用手抓搔眼睛、耳朵，并将手伸进口中吸吮。
如果在婴儿视野之外，大约15～20厘米的位置轻轻摇铃，他就会把目光投向摇铃的方向。

第一图书网, tushu007.com

媒体关注与评论

第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

编辑推荐

《宝宝意外伤害防救全方案》：妈妈与其以“安全”的名义，让孩子这也小能做，那也不能做，不如切实提高自己的安全意识和本领，让孩子尽情活动，远离危险，平安成长。
“缔造生命”是一件神奇而伟大的事，而“呵护生命”更是一场旷日持久的“大战”，更能考验父母的心智、耐心和体力。
在这场大战中，我们必须打胜，所以，我们需要认真学习。
就让我们从如何保卫我们缔造的“成果”的安全知识和方法学起吧，因为“万事安为先”！
——本书作者

第一图书网, tushu007.com

<<宝宝意外伤害防救全方案>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com