

<<常见病社区防治手册>>

图书基本信息

书名：<<常见病社区防治手册>>

13位ISBN编号：9787807407591

10位ISBN编号：780740759X

出版时间：2011-11

出版时间：上海文化出版社

作者：王永斌 编

页数：531

字数：457000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<常见病社区防治手册>>

### 内容概要

随着医改的深化，社区和家庭已成为医疗卫生工作的重心。因此，基层医务人员与社区居民都十分渴望了解常见病防治知识，以不断提高健康意识和保健水平。

王永斌编著的《常见病社区防治手册(修订本)(精)》从家庭、社区的角度，精选了250余种常见病、多发病；每种病又按典型表现、治疗方案或紧急处理、保健处方或预防措施等几个方面，进行详细、具体的介绍。

同时，还采取问与答的形式，就人们关心的主要问题，予以颇具针对性的解释，实用性和指导性甚强。

《常见病社区防治手册(修订本)(精)》既是每一个现代家庭必不可少的良师益友，又可作为社区基层医生防治常见病的行动指南。

<<常见病社区防治手册>>

书籍目录

第一章 常见症状

发热  
头痛  
眩晕  
意识障碍与昏迷  
呼吸困难  
咳嗽与咳痰  
咯血  
心悸  
腹痛  
恶心与呕吐  
腹泻  
呕血  
便血  
便秘  
血尿  
排尿困难  
尿频、尿急与尿痛  
抽搐与惊厥

第二章 呼吸、心血管、消化科疾病

急性气管-支气管炎  
慢性支气管炎  
阻塞性肺气肿  
支气管哮喘  
支气管扩张  
肺结核  
肺脓肿  
自发性气胸  
胸腔积液  
呼吸衰竭  
高脂血症  
动脉粥样硬化  
原发性高血压  
冠状动脉粥样硬化性心脏病  
心律失常  
心绞痛  
急性心肌梗死  
心脏性猝死  
心肌病  
急性心包炎  
慢性肺源性心脏病  
慢-陀风湿性心脏病  
心力衰竭  
反流性食管炎

<<常见病社区防治手册>>

肠结核  
肝性脑病  
胆囊炎  
胰腺炎  
克罗思病  
溃疡性结肠炎  
消化性溃疡

第三章 血液、肾脏、内分泌科疾病

再生障碍性贫血  
急性白血病  
慢性粒细胞白血病  
血小板减少性紫癜  
过敏性紫癜  
血友病  
急性肾小球肾炎  
尿路感染  
慢性肾盂肾炎  
肾病综合征  
IgA肾病  
急性肾功能衰竭  
慢性肾功能衰竭  
乳糜尿  
低血糖症  
糖尿病  
痛风病  
尿崩症  
垂体性侏儒症  
地方性甲状腺肿  
甲状腺功能亢进症  
甲状腺功能减退症  
肥胖症

第四章 外科疾病

肠梗阻  
肠息肉  
腹外疝  
急性腹膜炎  
阑尾炎  
痔疮  
良性前列腺增生  
尿石症  
前列腺炎  
胆石症  
急性乳腺炎  
门静脉高压症  
乳腺囊性增生症  
下肢静脉曲张  
丹毒

<<常见病社区防治手册>>

- 第五章 骨科疾病
- 第六章 妇产科疾病
- 第七章 儿科疾病
- 第八章 神经与精神疾病
- 第九章 传染性疾病
- 第十章 恶性肿瘤
- 第十一章 眼科疾病
- 第十二章 耳鼻喉科疾病
- 第十三章 口腔科疾病
- 第十四章 皮肤科疾病
- 第十五章 中毒及意外

## &lt;&lt;常见病社区防治手册&gt;&gt;

## 章节摘录

阻塞性肺气肿是肺部远端的气室到末端的细支气管出现异常持久的过度膨胀、充气和肺容积的增大，并伴有肺泡壁和细支气管的破坏而无明显的纤维化，多有不同程度的气道阻塞。

阻塞性肺气肿的定义实际为病理解剖术语。

阻塞性肺气肿常继发于慢性支气管炎、支气管哮喘、间质性肺炎等疾病，也可因长期吸烟、长期吸入有害化学物质或粉尘等引起。

临床以咳嗽、咳痰为多，可在劳动、上楼时出现气喘，逐渐加重后可出现呼吸困难、发绀，并可逐步丧失劳动力，最后可演变为呼吸衰竭或心力衰竭。

典型表现 (1) 本病大多有慢性支气管炎的基础，发展缓慢，也可由长期吸烟或长期吸入粉尘或有害物质逐渐演变而来。

(2) 临床以咳嗽、咳痰为主，痰呈黏液性，合并感染时呈脓性或黏液脓性。

可在活动时出现胸闷、气喘，随着病情进展，可出现呼吸困难，口唇发绀，甚至休息时也出现呼吸困难。

合并感染时，上述症状可进一步加重，逐渐丧失劳动能力，最后可发展为呼吸衰竭或心力衰竭或自发性气胸。

(3) 体检表现为病人胸部过度膨胀，肩部抬高，胸廓前后径增大呈桶状胸，胸廓运动减弱；触诊语颤减低，叩诊呈过清音、心界缩小或消失、肝上界下移，听诊呼吸音减弱、呼气延长、用力呼气可有干啰音（合并感染时可有湿啰音）、心音轻远、最大搏动点可移至剑突下、肺动脉瓣区第二音亢进，发生肺心病右心衰时可有颈静脉怒张、肝肿大、下肢浮肿。

(4) 辅助检查：X线胸片表现为肺容积扩大，肋骨走向变平，肋间隙增宽，肺野透明度增加，肺纹理减少，横膈低平，心影狭长。

肺功能测验示残气及残气/肺总量增加，第一秒用力呼气量/用力肺活量比值减低（小于60%），或最大通气量占预计值80%以下，弥散功能减低，经支气管扩张剂治疗，肺功能无明显改善。

.....

<<常见病社区防治手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>