<<新编护士用药手册>>

图书基本信息

书名:<<新编护士用药手册>>

13位ISBN编号:9787810712033

10位ISBN编号:7810712039

出版时间:2001-6

出版时间:北京大学医学出版社

作者:王静芬

页数:487

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<新编护士用药手册>>

内容概要

本手册针对护理人员临床用药特点而编写,是护理人员的工具书,对临床医生、药剂人员和在校 医学生也有参考价值。

手册共收载药物I千余种,药物的遴选参照1998年卫生部颁布的《国家基本药物(西药)》,并适当增加——些近年来上市的新药。

书中除简要介绍药物的"用途"、"不良反应"、"制剂"外,重点介绍"用药护理注意"和"用法"。

内容力求新颖实用、简明规范、检索方便。

药物的中文正名以2000年版《中华人民共和国药典》和《新编药物学》第14版为准,英文采用INN名,括号内为别名(包括收录的大量药物向品名。

书后附有"皮试药物一览表"、"输液滴注速度计算法"等4种附录和中、英文药名索引。

书中药物剂量如未特殊标明,都是成人剂量。

<<新编护士用药手册>>

书籍目录

二、抗寄生虫病药 三、抗肿瘤药物 四、主要作用于中 一、抗微生物药 枢神经系统的药物五、作用于传出神经系统的药物 六、麻醉药及其辅助药物 七、主要作 用于循环系统的药物 八、主要作用于呼吸系统的药物 九、主要作用于消化系统的药物 十、主要作用于泌尿系统的药物 十一、作用于血液及造血系统的药物 十二、 十四、妇产科用药 十五、维生素类 抗变态反应药 十三、激素及有关药物 十六、调节水、电解质及酸碱平衡药 十七、治疗骨质疏松药 十八、营养药 十九、影 响机体免疫功能的药物二十、消毒防腐药 二十一、皮肤科用药 二十二、诊断用药 二十四、生物制品 二十三、解毒药 附录一: 处方常用拉丁文缩写词及其意 附录二: 皮试药物一览表 附录三: 用药剂量计算法 附录四: 输液滴注速度计算 法 英文药名索引 中文药名索引

<<新编护士用药手册>>

章节摘录

氨苄西林Ampicillin (氨苄青霉素、安比西林、安西林、安必仙) 【用途】广谱,主要用于革兰阴性杆菌感染。

【不良反应】1、过敏反应。

皮疹发生率高,可引起过敏性休克。

- 2、口服致胃肠道反应。
- 3、肌注疼痛显著。
- 4、大剂量静脉给药可发生青霉素脑病。

【用药护理注意】1、应在使用前临时配制,因溶解放置后致敏物质增多。

- 2、在酸性液体中分解加快,应选用中性液体作溶剂,不宜用葡萄糖液作溶剂。
- 3、青霉素过敏者禁用。
- 4、同青霉素钠(钾)。

【制剂】片、胶囊: 0.25g。

粉针(有效期2年):0.25g、0.5g、Ig。

【用法】口服、肌注:每次0.5—1g,3-4次/日,儿童50-l00mg/(kg·d),分3-4次,空腹口服

静滴:每次1~3g,溶于I00mI输液内滴注0.5-I小时,3-4次/日。

儿童100~150mg/(kg.d),分4次。

InjectiOn (舒氨西林、氨苄西林-舒巴坦、氨苄青霉素-青霉烷砜、优立新、普舒) 【用途】广谱,用于敏感菌所致的尿路、呼吸道、腹腔、耳鼻喉科等感染。

【不良反应】皮疹、SGPT增高、胃肠反应,偶见过敏性休克。

【用药护理注意】1、与青霉素有交叉过敏反应,用药前用青霉素钠作皮试,青霉素过敏者禁用

- 2、注射液应在使用前临时配制。
- 3、肌注疼痛明显,可用0.5%利多卡因作溶媒。

【制剂】粉针(氨苄西林与舒巴坦的复合制剂):0.75g、1.5g。

【用法】静注、静滴:轻症,1.5~3g/d,分2-3次;重症,6~12g/d,分3-4次,静滴不超过12g/d。

临用前用注射用水或生理盐水溶解后加入I00ml生理盐水中滴注, 0.5-1小时滴完。

小儿150mg / (kg.d),分3-4次肌注或静滴。

肌注:少用,每次0.75q,2-4次/日。

托西酸舒他西林SultamicillinT0silate(优立新、优力新、舒氨新、博德、Unasyn)为氨苄西林与舒巴坦的复合制剂。

同注射用氨苄西林钠舒巴坦钠,有消化道反应,用药前用青霉素钠做皮试,青霉素过敏者禁用。

颗粒剂、胶囊(博德):0.125g、0.375g。

片:0.375g.口服:每次0.375g,2-4次/日,空腹服。

.

<<新编护士用药手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com