

<<癌症用药配餐指南>>

图书基本信息

书名：<<癌症用药配餐指南>>

13位ISBN编号：9787810869478

10位ISBN编号：7810869477

出版时间：2011-5

出版时间：第四军医大学

作者：马洪悦，杨晓颖

页数：255

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<癌症用药配餐指南>>

内容概要

本书是一本癌症患者的用药配餐指南，共分为三部分，包括癌症的基本常识、癌症的用药常识及癌症的药膳食疗，为癌症患者的用药、饮食及保健提供全面的解析，是癌症患者的良师益友、家庭医生。

我们衷心地希望癌症患者通过阅读此书，对癌症有更深入的了解，了解更多的用药常识，增强与病魔抗战到底的决心及信心，早日康复。

需要注意的是，由于患者病情不同及个体差异，书中介绍的有关知识仅供患者日常用药和饮食参考借鉴，读者在阅读本书的同时，还应接受临床医生的治疗和指导。

<<癌症用药配餐指南>>

书籍目录

第一篇 了解癌症，关注健康

第一章 癌症基本常识

什么是癌症

什么是“癌症性格”

良性肿瘤和恶性肿瘤怎样区分

哪些体检能发现早期癌症

儿童患癌的常见信号

警惕内脏肿瘤的皮肤表现

不同类型的阴道恶性肿瘤的表现

哪些癌症遗传性较明显

第二章 癌症患者最关心的问题

癌症可以预防吗

癌症与职业密切相关吗

睡眠不足易患癌吗

癌症患者失眠怎么办

癌症能“自然消退”吗

癌痛的原因与误区有哪些

癌症转移有哪几种方式

警惕几种常见的癌前病变

癌症患者康复期应注意什么

癌症患者该如何自我调节

第二篇 科学用药，保障健康

第一章 癌症的用药常识

癌痛时，怎样选择止痛药

如何选用抗癌药

抗癌药有哪些不良反应

哪些药物可治病也可致癌

怎样合理用药

家庭用药要注意哪些问题

感冒时用药有哪些误区

如何正确认识化疗

哪些情况下需要暂停化疗

吗啡止痛会成瘾吗

化疗药物有哪些种类

第二章 癌症常用药物

烷化剂

抗代谢类

抗生素类

植物类

激素类

免疫抑制剂

中成药

注射剂

第三章 常见癌症的用药方略

肺癌

<<癌症用药配餐指南>>

胃癌
肝癌
结肠癌
食管癌
前列腺癌
乳腺癌
宫颈癌
白血病
肾癌
卵巢癌
皮肤癌
淋巴瘤
膀胱癌
胰腺癌
口腔癌

第三篇 膳瞻食疗，吃出健康

第一章 癌症患者配餐常识

不同时期的饮食原则

有抗癌作用的食物

癌症患者的饮食禁忌

可减轻化疗毒性反应的饮食

化疗期间如何增加食欲

服药期间的饮食禁忌

改善化疗呕吐的非药物措施

化疗期间的食疗原则

第二章 癌症的合理配餐

肺癌食疗食谱

胃癌食疗食谱

肝癌食疗食谱

结肠癌食疗食谱

食管癌食疗食谱

前列腺癌食疗食谱

乳腺癌食疗食谱

宫颈癌食疗食谱

白血病食疗食谱

肾癌食疗食谱

卵巢癌食疗食谱

皮肤癌食疗食谱

淋巴瘤食疗食谱

膀胱癌食疗食谱

胰腺癌食疗食谱

口腔癌食疗食谱

<<癌症用药配餐指南>>

章节摘录

警惕内脏肿瘤的皮肤表现 隐匿的内脏肿瘤在皮肤上或多或少可找到一些蛛丝马迹，掌握和了解这些皮肤病变与内脏肿瘤的关系，对某些肿瘤的早期发现和确诊大有益处。

内脏肿瘤的皮肤表现主要有：
1. 皮肤炎 皮肤炎属自身免疫性肌肉炎症性疾病，是一种皮肤和肌肉的弥漫性非感染性炎症疾病。

炎症性肌病。

眼睑、鼻梁、面颊、前额和指甲周围的皮肤呈现紫红色红斑，特别是上眼睑和眼眶周围出现的红斑和肿胀，颜色宛如葡萄酒色，被称为紫红眼睑。

皮肤炎的内脏癌肿合并率为20%-30%，合并的肿瘤以乳腺癌、肺癌为多。

皮肤炎中的皮损与癌肿关系甚为密切，皮损如呈大红色充血，则提示有合并内脏癌肿的可能。

2. 皮肤红斑 离心性环状红斑的特征是皮疹开始时为红色斑丘疹，呈离心性扩大，而中央消退，每日可以1至数毫米速度扩大，直径在10厘米以上的也不少见，好发于躯干，特别是臀部。

形态变化急速，瘙痒显著，皮疹形态不一者与癌肿关系更为密切。

合并的肿瘤常为乳腺癌、肺癌等。

3. 黑色素增多 当肾上腺受癌侵犯时，肾上腺皮质功能不全，不能抑制垂体分泌的黑色素细胞刺激素；发生垂体肿瘤时，黑色素细胞刺激素分泌也增加。

所以，肾上腺和垂体患癌时，皮肤黑色素增多，肤色变黑。

4. 带状疱疹 研究表明，带状疱疹患者中约12.1%合并内脏癌肿。

年龄越大，患病几率就越大，50岁以上的带状疱疹患者合并癌肿达18%。

所合并的恶性肿瘤以淋巴系统恶性肿瘤为最多，其他有胃癌、肺癌、肠癌、食管癌等。

合并有内脏癌肿的带状疱疹有其特殊的表现。

一般的带状疱疹大多局限于身体的一侧，并且是终生免疫的，而恶性肿瘤合并的这种疱疹为全身散在性分布，并且经常反复发作。

5. 匍行性回状红斑 是一种呈木纹形、波形的环状红斑，其移动和形态变化更快，常有显著瘙痒。

有人指出，几乎所有病例均合并有内脏癌瘤，如乳腺癌、肺癌、头颈部癌等。

红皮症表现为皮肤持续潮红、脱屑、剧烈瘙痒，有人报告40岁以上者1/3-1/2有潜在淋巴瘤存在。

⋮

<<癌症用药配餐指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>