

<<围婚期保健>>

图书基本信息

书名：<<围婚期保健>>

13位ISBN编号：9787811360233

10位ISBN编号：7811360233

出版时间：2008-6

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：苏穗青 主编

页数：250

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<围婚期保健>>

前言

近些年来，人群和社区服务的观点已成为医学模式转变过程中最关键的转变，这是不断满足人民群众日益增长的健康需求和更快更好地发展卫生事业的必然要求。

妇幼卫生作为一门新兴的群体医学，具有不同于临床医疗、也不同于一般疾病预防的独特的学科特点，因而在增进人群健康和促进城乡社区卫生服务中有着不可替代的明显优势，它通过研究妇女儿童正常生理变化的规律及影响因素，采取技术策略和政策措施进行干预，并对干预效果进行评估与改进，达到提高妇女儿童整体健康水平的目的。

其内容不仅涉及医学，也涉及社会科学的相关领域。

妇幼卫生学科体系的建立和日臻完善，对于弥合近代预防医学和临床医学的裂痕，具有突破性的重大意义和深远影响。

我们从事妇幼卫生管理和业务技术工作的同志，都应把学习放在突出位置，务必深刻认识我们立足和服务的这个领域，准确把握新时期妇幼卫生工作方针所赋予的工作内涵和重大任务，为建设学习型、创新型的妇幼卫生专业队伍和发展妇幼卫生事业共同做出不懈的努力。

<<围婚期保健>>

内容概要

围婚期是人一生中重要的阶段，在心理和生理以及社会的适应能力方面都会产生一系列变化，这种变化对人们的生殖健康、孕育后代和今后的家庭生活起到连接和转化的作用。

围婚期保健正是针对这一时期提供的以医疗保健、健康促进为主要目的和内容的服务。

20世纪80年代中期，我国以婚前保健、新婚保健以及孕前保健为主题的围婚期保健，在全国各地展开

。1994年颁布的《中华人民共和国母婴保健法》将婚前医学检查列为依法服务，更加明确了包含婚前医学检查、婚前卫生咨询以及婚前卫生指导为主要内涵的婚前保健的重要性。

本书综述了围婚保健服务新理念，从生殖健康的基础入手，论述了婚前保健的医学检查、咨询服务和健康教育的意义和内涵，着重提出了婚前医学检查中常见的遗传病、传染病、性传播疾病、男女生殖系统疾病以及重要脏器疾病的婚育咨询指导，并对新婚期常见疾病的预防、婚后避孕方法选择以及孕前保健等生殖健康问题提出指导要点。

<<围婚期保健>>

书籍目录

第一章 围婚期保健概论	第一节 围婚期保健概念	1. 围婚期保健	2. 我国婚前保健服务	3
	. 婚前保健意义	4. 婚前保健服务对象特点	5. 婚前保健核心内容	第二节 围婚期保健管理
	6. 婚前保健服务评价	7. 婚前保健服务管理	第三节 围婚保健技术	8. 婚前医学检查特点
	9. 婚前医学检查核心内容	10. 婚前医学检查步骤	11. 婚前医学意见	12. 婚前卫生咨
	询意义	13. 婚前卫生咨询对象特点	14. 婚前卫生咨询分类及主要问题	15. 婚前卫生咨询
	技巧及步骤	16. 婚前卫生指导意义	17. 婚前卫生指导条件	18. 婚前卫生指导核心内容
	19. 婚前卫生指导方法	20. 婚前卫生指导评价	第二章 影响婚育的常见疾病	
	第一节 遗传性疾病与婚育			
	21. 遗传学的基本概念	22. 遗传病的基本诊断方法	23. 遗传病与先天性疾病、家	族性疾病
	24. 近亲结婚与遗传病	25. 单基因遗传病——常染色体遗传	26. 单基因遗传病	——性连锁遗传
	27. 多基因遗传病	28. 染色体病概述	29. 体细胞遗传病	30. 线粒体
	病	31. 常见染色体病	32. 与遗传有关的骨科疾病	33. 与遗传有关的皮肤病
	34. 与遗传有关的眼科疾病	35. 遗传性耳聋	36. 与遗传有关的神经系统疾病	37. 地中海贫血
	38. 其他常见与遗传有关的疾病第三章 常见问题与婚育		

<<围婚期保健>>

章节摘录

1) 临床表现本病多发于10—25岁，早可至4岁晚至50岁。

神经系统症状：肢体出现较大震颤、手足徐动、四肢屈曲、肌张力增高、舞蹈样动作；面具样脸孔，苦笑貌，语言含糊不清等。

肝脏损害：胃肠道症状，转氨酶增高、黄疸、可有腹腔积液、脾肿大等。

角膜色素环（K—F）：位于角膜周边，宽1—3毫米，呈黄棕色或黄绿色。

精神症状：易激动、兴奋、性格行为改变，后期可痴呆。

其他：出现肾性糖尿，高尿钙证，引起骨质疏松。

少数患者可出现急性溶血。

在10岁以前发病者，多以肝损害表现为主。

10岁以后发病者多以神经系统症状为主，病程进展较缓慢。

2) 治疗低铜饮食，药物治疗（减少肠道对铜的吸收）。

对症治疗。

服用左旋多巴减轻震颤及肌强直等。

3) 婚育指导首先应避免近亲婚配。

因是隐性遗传病，患者与正常人婚配所生子女不发病，只是携带者。

所以凡是与患者结婚的正常人都应进行基因诊断，排除隐性基因携带者的可能性。

凡是亲属中有此病的患者，建议双方进行基因诊断，早期诊断出杂合子，有利于今后生育指导。

<<围婚期保健>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>