

<<协和皮肤性病学素材库>>

图书基本信息

书名：<<协和皮肤性病学素材库>>

13位ISBN编号：9787811365702

10位ISBN编号：7811365707

出版时间：2012-4

出版时间：中国协和医科大学出版社

作者：郑和义 编

页数：491

字数：400000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<协和皮肤性病学素材库>>

内容概要

《协和皮肤性病学素材库》是协和皮肤性病学素材库图谱。针对皮肤性病以形态学为主的特点，精选了医院建院初期至20世纪60年代末期用黑白照片记录的各种皮肤性病的资料。

<<协和皮肤性病学素材库>>

书籍目录

一、病毒性皮肤病

- (一) 单纯疱疹
- (二) 水痘
- (三) 带状疱疹
- (四) 传染性软疣
- (五) 疣
寻常疣
跖疣
扁平疣
- (六) 鲍温样丘疹病
- (七) 疣状表皮发育不良
- (八) 麻疹
- (九) 手足口病

二、细菌性皮肤病

三、真菌性皮肤病

四、性传播疾病

五、寄生虫病

六、物理性皮肤病

七、变态反应性皮肤病

八、结缔组织病

九、神经功能障碍性皮肤病

十、角化与萎缩性皮肤病

十一、红斑鳞屑性皮肤病

十二、大疱与疱疹性皮肤病

十三、血管性皮肤病

十四、非感染性肉芽肿病

十五、皮肤附属器疾病

十六、内分泌、营养和代谢性疾病

十七、色素性皮肤病

十八、遗传性皮肤病

十九、黏膜疾病

二十、皮肤肿瘤

<<协和皮肤性病学素材库>>

章节摘录

版权页：插图：单纯疱疹是单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）感染所致的病毒性皮肤病。根据病毒类型不同，可分为HSV—1和HSV—2两种类型。

HSV—1与大多数非生殖器感染相关，主要侵犯口咽、扁桃体、眼、皮肤等部位；HSV—2主要侵犯生殖器部位，为性传播疾病病原之一。

单纯疱疹可分为原发型与复发型。

诊断 1.原发型单纯疱疹 初次感染HSV，表现为颜面（口腔）单纯疱疹、新生儿原发单纯疱疹及生殖器疱疹等，在相应部位出现簇集小水疱，破溃后形成小溃疡及糜烂面。

症状多较重，多伴有发热、全身不适、周围淋巴结肿大等全身症状。

可以自愈，病程约2周，较易复发。

2.复发型单纯疱疹原发性感染消退后，20%～40%的患者在某些诱因下复发。

多有前驱症状，如痒感、灼热感、针刺感等，皮损较原发皮损小而密集，表现为红斑及簇集的小水疱，可以有糜烂、渗出、结痂，易于形成溃疡。

可伴发热、不适等全身症状，病程1～2周，可反复发作。

鉴别诊断 1.面部带状疱疹 皮疹多数沿三叉神经或面神经的分支分布，基底炎症明显，呈带状排列，伴有神经痛。

2.脓疱疮 散在性脓疱，其周围红晕明显，有蜜黄色结痂。

多见于儿童暴露部位，夏秋季节多见。

治疗 1.全身治疗 本病有自限性，1～2周可自愈。

对于严重感染者，为缩短病程，防止继发感染和复发，可口服抗病毒药物如阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦等。

2.局部治疗 以抗病毒、干燥、收敛及预防感染为主。

可外用无环鸟苷（阿昔洛韦）软膏、疱疹净（碘苷）滴眼液、喷昔洛韦乳膏、酞丁胺搽剂、2%龙胆紫（甲紫）液及抗生素软膏等。

3.物理治疗 对频繁复发或病情严重者可作紫外线照射，氩氦离子激光照射。

2.跖疣（verruca plantaris）跖疣是发生在足跖部的寻常疣。

因该部位角质层较厚，临床表现不同于寻常疣。

诊断（1）皮损由于压迫形成淡黄或褐黄色胼胝样斑块，表面粗糙不平，灰黄或污灰色，如将表面角质刮去，中心可见紫黑色出血点。

（2）好发于足跟、跖前部等受压部位，有压迫痛。

治疗 物理和药物治疗同寻常疣。

3.扁平疣 扁平疣（verruca planar）由人类乳头瘤病毒感染引起，病毒分型为HPV3及HPV5型。

诊断（1）青少年多见。

好发于面部、手背或前臂。

<<协和皮肤性病学素材库>>

编辑推荐

《协和皮肤性病学素材库》对各种常见皮肤病进行了简明扼要的重点讲解，图文并茂，看图识病，使读者一目了然。

<<协和皮肤性病学素材库>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>